

四庫全書

子部

# 欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百三十五

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣嵇承志

膳錄監生臣宋 昂

欽定四庫全書

普濟方卷二百三十四

明

周王朱橚撰

虛勞門

虛勞心腹痞滿

附論

夫虛勞之人氣弱血虛榮衛不足復為寒邪所乘食飲  
入胃不能傳化停積於內故中氣痞塞胃脹不通使人  
心腹痞滿也

方

參苓煮散 治虛勞心腹痞滿不思飲食胸膈不利

人參 白茯苓去黑皮 丁香 木香 桂去麝皮 益智

去青橘皮湯浸去白焙 芎藭 蓬莪茂剉 乾薑炮 附子

炮製去皮 遠志去心 白朮 厚朴去麝皮臍各半兩 黃耆剉炒

半夏湯浸二遍用生薑汁製 當歸切焙 荊三稜炮剉 陳廸炒 麥蘖

炒各一兩 肉苳蔻去殼 檳榔剉 訶梨勒煨去核各五枚

右為散每服三錢入鹽少許水一盞煎至七分去滓

溫服

乾地黄丸

出千金方

治虛血勞胸腹煩滿疼痛瘀血往來臟

虛不受穀氣逆不得食補中理虛

乾地黄

三兩

當歸

乾薑

麥門冬

甘草

黃芩

各二兩

厚朴

枳實

防風

大黃

細辛

白朮

各一兩

茯苓

五兩

前胡

六分

人參

蟲蟲

麋蟲

各五枚

乾

漆

一兩

右為末蜜和丸如梧桐子大先服十丸日三稍加

訶梨勒湯

出聖惠方

治虛心勞腹痞滿脇肋妨悶不思飲食

訶黎勒

煨去核

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白焙

前胡

去蘆

頭各一兩

白朮

紫蘇葉

黃耆

剉

人參

檳榔

剉草

荳蔻

去皮各三分

桔梗

炒

木香

甘草

炙剉

桂 去麤皮各半兩

右為散每服三錢水一盞入生薑一分切碎煎至七

分去滓溫服

木香煮散 治虛勞冷氣心腹痞悶腸鳴腹痛飲食減

少

木香 白朮

縮砂

去皮

益智

去皮

藿香

用葉

人參

各一兩

丁香

半兩

陳橘皮

湯浸去白焙

青橘皮

湯浸去白焙各四兩

桔梗

炒三

兩桂

去麤皮

厚朴

去麤皮生薑汁炙各二兩

高良薑

一分

甘草

炙剉半兩

右為散每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚擘破

煎至七分和滓稍熱服如不及煎入鹽少許加湯點

服

木香散

出聖惠方

治虛勞冷氣不和氣攻心腹痞滿不思飲

食

木香

半兩

訶黎勒

一兩煨用皮

人參

去蘆頭

桂心

白朮

荆三稜

炮剉

芫薺

檳榔

赤茯苓

桔梗

去頭

枳

實

各三分 麩炒微黃

陳橘皮

湯浸去白 剉焙一兩

吳茱萸

湯浸七遍 焙乾微炒

甘草

各一分 炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

人參煮散

治虛勞心胸痞悶腹脇虛脹補虛進飲食

人參

去麁皮

陳橘皮

湯浸去白焙

鼈甲

去裙襴醋炙各一兩

附子

炮製

去皮

縮砂蜜

去皮

桂皮

乾薑

炮

柴胡

去苗

桔梗

畧炒當



歸

各三分切焙

五味子

甘草

剉炒各半兩

右為散每服三錢水一盞入生薑二片鹽少許同煎

至七分去滓溫服每日空心午前日晚各一

茵陳煎丸

治虛勞下焦虛冷心腹痞滿喫食無味舌

澁口乾四肢少力健脾胃

茵陳蒿

三兩搗為末用醋一升煎為膏

鼈甲

去裙襴醋浸炙令黃色

荊三稜

煨杵碎各一兩

附子

炮製去皮臍

枳殼

去穰麩炒

桂

去麁皮

青橘皮

湯浸

去白焙各半兩

柴胡

去苗一兩

白朮

半兩

厚朴

去麁皮生薑汁塗炙

吳茱萸

水浸一宿焙  
乾炒各一兩

乾薑炮製  
半兩

右除茵陳外搗羅為末用茵陳煎和為丸如梧桐子  
大每日空心生薑湯下三十丸如和不成更入熟蜜  
半夏散 治虛勞心腹痞滿胸膈壅悶不思飲食

半夏湯洗七遍去滑

鼈甲

塗醋炙令黃去裙襴

白朮

人參

去蘆黃

著剉

赤茯苓

各一兩

桔梗

去蘆頭

甘草

微炒

木香

各半兩

桂心

前胡

去蘆頭

陳橘皮

各一兩湯浸去白瓢焙

右為散每服三錢以水一中盞入薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候稍熟服忌生冷油膩葷菜

厚朴丸

出聖惠方

治虛勞冷氣心腹痞滿四肢少力不欲飲

食

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙令香熟一兩

木香

半兩

桂心

附子

各三分炮

製去皮臍

人參

半兩去蘆頭

黃耆

三分

陳橘皮

湯浸去白瓢焙

訶梨勒

煨用皮

白朮

草薢

各一兩去皮

乾薑

炮製剉

當歸

右為末煉蜜搗和二三百杵丸如梧桐子大每食前

生薑湯下三十丸

白朮丸

出聖惠方

治虛勞冷氣心腹痞滿不思飲食四肢少

力疼痛

白朮

人參

當歸

各三分去蘆頭

桂心

附子

各一兩炮製去

皮臍木香

三分

桔梗

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白穰焙

訶梨勒

煨用皮

石斛

去根剉

黃耆

各一兩剉

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服食

前以溫酒下三十丸

草豈蔻丸

出聖惠方

治虛勞心腹痞滿脇下妨悶不思飲食

草荳蔻

一兩去皮

木香

半兩

當歸

三分

前胡

去蘆頭

人參

去蘆頭

檳榔

白朮

訶梨勒

各一兩煨皮焙

赤茯苓

桂心

陳橘皮

湯浸去白穰焙

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食

前以生薑湯下三十丸

桔梗散

出聖惠方

治虛勞心腹痞滿不思飲食胸膈不利

桔梗

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白穰焙

人參

去蘆頭

赤茯苓

厚

朴

去麁皮塗生薑汁炙令香熟

木香

前胡

各一兩去蘆頭

杏仁

湯浸去皮

尖雙仁麩  
炒微黃

甘草

各半兩炙  
微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

木香散

出聖惠方

治虛勞心腹痞滿氣攻兩脇滿痛不思飲

食

木香

檳榔

桂心

各半兩

青橘皮

湯浸去白穢焙

當歸

白朮

各三分

訶梨勒

煨用皮

柴胡

去苗

鼈甲

各一兩塗醋炙令微黃去

襴裙

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷油膩菹菜等

訶梨勒丸

出聖惠方

治虛勞心腹痞滿脇不時痛不思飲食

訶梨勒

煨用皮

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙令香熟

檳榔

白朮

人參

桂心

各一兩

乾薑

炮製剉

吳茱萸

各半兩湯浸七遍焙乾微

炒

當歸

三分

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前以生薑湯下三十丸

萆澄茄丸

治虛勞冷氣上衝心腹痞滿腹鳴相逐或

多刺痛嘔噦膨脹

萆澄茄

沉香

丁香

木香

懷香子

舶上者炒各半

兩

烏藥

剉一兩

白芷

葫蘆巴

炒三分

右為末煉蜜為丸彈子大每服一丸生薑湯嚼下

前胡丸

治虛勞胸膈痞悶氣逆煩滿脇肋虛脹

前胡

去蘆頭

人參

白茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白穢

桂

去麤皮

白朮

各一兩半

杏仁

去皮尖雙仁入麩炒研

檳榔

剉各二兩



右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下日

二

黃耆建中湯

一名黃耆湯

療虛勞腹滿食少小便多

方見本門虛勞

裏急類

建中丸 治虛勞脾胃冷弱心腹痞滿不思飲食四肢

怠墮補虛調胃

人參 白朮

厚朴

去麋皮薑汁炙

乾薑

炮

陳橘皮

湯浸去白

焙

枳殼

去穰麩炒各半兩

訶梨勒

三枚炮取皮

右為末以煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸薑橘皮湯下不拘時候

柴胡飲

一名苗奇湯

治虛心腹痞滿不思飲食

方見本門虛勞羸瘦類

柴胡湯

治虛勞氣逆心腹痞滿四肢羸瘦腹脹不下

食

柴胡

去苗三兩

枳殼

去穰麩炒二兩

白茯苓

去黑皮二兩

白朮

二兩

參

一兩 麥門冬

去心焙一兩

右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑半分拍碎煎至

七分去滓空腹溫服日午夜卧各一

白朮散

出聖惠方

治虛勞冷氣心腹痞滿不思飲食四肢少

力

白朮

訶梨勒

煨用皮

陳橘皮

湯浸去白穢焙

草豈蔻

各一兩去

皮

人參

去蘆頭

桂心

各三兩

右為散每服四錢以水一盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不拘時稍熱服

虛勞積聚

附論

夫氣之所積名曰積其本在臟陰所生也氣之所聚名曰聚其本在腑陽之所生也臟病無止而不移腑病無所留結是為積聚虛勞之人陰陽傷損血氣澀滯不能宣通各隨其腑臟之氣而留結故成積聚之病也

方

大鼈甲丸 治虛勞積聚心腹脹滿喘促氣逆面色萎黃痰嗽心怯不思飲食

鼈甲

一枝重二兩  
去裙襴醋炙

柴胡

去苗

大黃

濕紙裹煨

熟乾地黄

焙

烏梅

去核炒

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒各一兩

乾薑

炮

檳榔

剉木

香

人參

白茯苓

去黑皮

芫荽

桂

去麁皮

紫苑

去苗

土

芍藥

牛膝

酒浸切焙

知母

焙

荆三稜

炮剉

五味子

白朮

黃連

去麁皮鹽汁炙

厚朴

黃芩

去黑心

陳橘皮

浸湯

去白焙

枳殼

去穰炒

當歸

切焙各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸三十丸

溫酒下日三

補真丸 治冷勞心腹積聚羸瘦盜汗不思飲食腹脹

下痢四肢無力

厚朴

炮製去皮  
薑汁炙

蒼朮

去皮米泔浸  
切焙各四兩

陳橘皮

湯浸去  
白焙

石斛

去根  
炮製去皮臍

柴胡

去苗

人參

白茯苓  
去黑皮

沉香

各二兩

丁香

鼈甲

去裙襴  
醋炙

肉蓯蓉

酒浸去皺  
皮切焙

木香

巴戟天

去心  
當歸切

草豆蔻

去皮  
桂皮去麤皮

訶梨

勸

炮去  
核

五味子

檳榔

判

山茱萸

杜仲

去麤皮  
炙判

黃耆

判三  
兩

補骨脂

炒各  
一兩

吳茱萸

半兩湯浸洗  
三遍焙乾炒

右為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十九丸米飲

下日三

烏頭丸

治虛勞心腹積聚及百病邪氣往來遯遯槍

心羸瘦不能食破積聚並宜服之

烏頭

炮製去皮  
臍一兩

前胡

去蘆  
頭

黃芩

去黑  
皮

蜀椒

去目并  
閉口者

炒出汗

白頭翁

水洗五  
遍焙

甘草

炙

龍骨

研

半夏

湯浸去  
骨焙

黃連

去  
鬚

吳茱萸

水洗五  
遍焙

白朮

細辛

去苗  
葉

紫苑

去  
苗

土桔梗

乾薑

炮

萎蕤

芎藭

厚朴

去麤皮  
薑汁炙

礬

石

燒令  
汁盡

人參

桂

去麤  
皮

生薑

切焙各  
半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下日午臨卧再服

靈感丸 治虛勞積聚腹脇堅滿男子婦人一切風勞冷氣頭旋眼疼手脚癢痺血風勞氣攻擊五臟四肢筋脉掉動面上習習似蟲行徧生瘡癬心膈煩悶腹疼虛鳴腰痛膝冷手足或熱諸氣刺痛嘔逆醋心胃悶澁肺氣發動耳復虛鳴脚膝無力仍治婦人諸病冷血勞氣髮損面黃氣刺心腹骨節痠疼經年不調



經年逾月或下過多不定兼治冷熱諸痢脚氣水腫等

柴胡

去苗

防風

去叉

紫苑

去土

當歸

切

赤茯苓

去皮

乾

黑

乾

薑

炮製

桔梗

炒

菖蒲

烏頭

炮皮

厚朴

去生薑汁炙

厚朴

去生薑汁炙

厚朴

去生薑汁炙

大黃

吳茱萸

湯浸

皂莢

去皮子

蜀椒

去目并閉

蜀椒

去目并閉

蜀椒

去目并閉

蜀椒

去目并閉

陳橘皮

去白

郁李仁

別研

黃連

去鬚

巴豆

去油

巴豆

去油

巴豆

去油

巴豆

去油

參

半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心酒飲任下

五丸取微利為度如風冷氣人長服此藥最佳又宜  
夜服

天通丸 治虛勞心腹積聚脇下刺痛肌體羸瘦不欲  
飲食及八風十二痺氣血不榮久服身體潤澤

熟乾地黃焙半 天門冬焙去心 白朮剉 乾薑炮 當歸

切石斛去根 甘草炙 肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙 芍藥 人參

大黃炙 紫苑洗各一兩半 白茯苓 防風去叉 麻仁生研各三

分 白芷半 蜀椒去目及閉口炒出汗一兩 杏仁三分湯浸去皮尖雙仁炒

右為末煉蜜煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸

米飲下日三

狼毒丸 治虛勞積聚腹中堅硬氣脹喘急

狼毒

二兩半  
醋浸尖

肉桂

二兩去  
皴皮

川烏頭

半兩去皮  
臍醋拌炒

荊三

稜

一兩  
炮剉

紫苑

三分洗  
去苗土

附子

一兩炮製  
去皮臍

川大黃

二兩  
半剉

碎微  
炒

鼈甲

二兩塗醋炙  
微黃去裙襴

甜葶藶

三分隔紙  
炒令紫色

檳榔

二兩

鮑甲炙

桃仁

二兩湯浸去皮尖  
雙仁麤炒微黃

木香

各一兩

芫花

半兩

醋拌炒  
令乾

吳茱萸

湯浸七遍焙乾  
微炒該一兩

皂莢

三分湯浸去  
皮塗酥炙黃

焦去  
子

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心溫酒下十丸忌菹菜濕麵生冷

鼈甲散 治虛勞積聚或心腹疼痛四肢羸瘦小便赤

不能飲食

鼈甲

二兩酥醋炙  
微黃去裙襴

厚朴

一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟

木香

檳榔

各三分

神麴

二兩搗碎微炒

荊三稜

一兩炮剉

川大黃

二兩剉碎

微炒  
芎藭

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麴炒微黃

青橘皮

各三分湯浸去白穰

焙桂心

當歸

半兩

麥蘗

各一兩  
炒微黃

赤芍藥

一兩

柴胡

一兩

半去  
苗

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服忌荳菜生冷

橘皮丸 治脾腎虛勞心腹積聚面色萎黃不思飲食  
胃膈悶滿

青橘皮

二兩麩炒黃搗羅為末醋一盞半於銀石器內文武火熬成膏

木香

桂

去麁  
皮用

人參

訶梨勒皮

炒

荊三稜

炒

藿香

去  
莖

厚朴

去麤皮  
薑汁炙

當歸

切焙

草薢

乾薑

炮各半兩

半夏

一分湯洗十遍焙

右搗羅十一味為末入橘皮煎內搗三二百杵丸如

梧桐子大每服二十九空心日午溫米飲下

青金煮散 治虛勞積聚不消心腹煩悶脾胃氣滯不

思飲食

青橘皮

湯浸去白焙

白朮

木香

薑黃

檳榔

剉郁

杏仁

湯浸去皮炒

棟實

剉炒

懷香子

人參

益智

去皮炒

赤茯苓

去黑皮

白牽牛

微炒各兩半

右為散每服二錢水一盞入生薑二片鹽一匙煎至

七分去滓稍熱空心服

防葵丸

出聖惠方

治虛勞積聚脇下妨滿腹脹不能食及腹

中痛

防葵

柴胡

各一兩去苗

木香

三兩桂心

半兩桃仁

湯浸去皮尖雙

仁麩炒微黃

鼈甲

酥醋炙微黃去裙襴

川大黃

各一兩剉碎微炒

當歸

荊三稜

一兩剉

檳榔

赤芍藥

半兩郁李仁

各一兩湯浸去皮尖

微炒

右為末煉蜜和搗五百杵丸如梧桐子大每服食前  
溫酒下二十丸忌菹菜生冷濕麵

三稜丸

出聖惠方

治虛勞積聚痞結腹脇脹滿

荆三稜

三兩炮剉

川大黃

二兩剉碎微炒

赤芍藥

桂心

乾

薑

各一兩炮裂剉

鼈甲

塗醋炙微黃去裙襴

訶梨勒

炮用皮

檳榔

各二兩

川烏頭

炮製去皮臍

吳茱萸

各一兩湯浸七遍焙乾微炒

桃仁

四兩湯浸

去尖雙仁

麩炒微黃

右為末熬醋如膠和搗三二百杵丸如梧桐子大每



服食前以溫酒下二十九丸漸加至三十九丸下爛肉黑

膿為度

赤茯苓散

出聖惠方

治虛勞積聚心腹壅悶喘息氣促不能

飲食四肢瘦弱

赤茯苓

一兩

紫苑

三分洗去苗土

白朮

半兩

當歸

半兩

吳茱萸

一分

湯洗七遍焙乾炒

郁李仁

三分湯浸去皮尖微炒

人參

半兩去蘆頭

鼈甲

二分塗醋炙微黃去裙襴

桂心

檳榔

各半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五

分去滓食前溫服忌荳菜濕麵生冷

韭子丸 治虛勞積聚滿悶疼痛及一切風勞冷氣積

年不瘥攻擊四肢偏體痠痛面無顏色或即浮腫膝  
虛腫行步無力大腸閉澀常結糞膝冷腰疼喫食無  
味兼治婦人虛冷血氣年深不愈氣攻四肢心膈刺  
痛經脉不調面如蠟色手足虛腫等

韭子

二兩以醋湯煮後  
炒令如油麻者

牛膝

酒浸切焙

當歸

切焙去麁皮

人參

乾薑

炮製

芫薺

大黃

各半兩

巴豆

九十粒去皮心麁炒

別研  
出油

黃耆

一兩

鍾乳粉

一兩半

白茯苓

一兩

雲母粉

一兩半

遠志

一兩  
去心

細辛

右為散鍾乳粉等更都研令勻每服以溫酒調下二

錢日服三二

磁石木香丸

出聖  
惠方

治虛勞目暗或見黑花

磁石

三兩燒令通赤以醋淬  
七遍搗碎研水飛過

木香

一兩

乾薑

三兩用  
漿水一

斗鹽花一合與附子一處以  
慢火煮水盡為度片切焙乾

漢椒

三兩醋浸一宿  
取出用炭火半

稱燒地令通赤將椒薄攤於  
地上以盆子蓋却一宿取出

附子

三兩炮製  
去皮臍

右為散入磁石都研令勻用羊腎二對切去脂膜入砂盆內細研用酒二升同熬成膏入藥味和為丸如梧桐子大每日空心及晚食前以鹽湯下三十丸

神麴丸 治虛勞目暗昏悶宜服治元臟風虛明目百

歲可讀細書

一名磁石丸

神麴末

四兩炒微黃

磁石

二兩燒通赤以醋淬七遍搗碎研水飛過

硃砂

一兩

細研水飛過

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服於

食前以粥飲下三十丸忌羊血

補肝散 治虛勞目暗

地膚子

一斗陰  
乾搗末

生地黃

十斤

石搗取地黃汁和半地膚末乾却搗羅為散每服以  
溫水調下二錢日三服一方用酒服

又方

用三月採蔓菁花陰乾為末每服空心以井花水  
調下二錢久服長生明目可夜讀細書

又方

用蔓菁子一升以水九升煮令汁盡取出曝乾如

此三度後羅為末每服以溫水調下二錢日二三

服

千金翼方百日身  
熱瘡出不久自差

虛勞耳聾

夫腎候於耳勞傷則腎氣虛風邪入於腎經則令人耳  
聾而鳴若膀胱有停水浸漬於腎則耳聾而滿也

方

磁石丸 治虛勞腎臟之弱耳聾或常聞鐘磬風雨之

聲宜服補腎虛

磁石

二兩燒令赤以醋淬七遍搗碎研水飛過

鹿茸

一兩半去毛塗酥炙微黃

人參

去蘆頭

黃耆

剉白茯苓

各一兩 遠志

去心 附子

炮製去皮臍 牡

蠣

各三分燒為粉

牛膝

一兩去苗

防風

三分去蘆頭

楮實子

一兩半水淘去

浮者焙乾

五味子

半兩 薯蕷

巴戟

各三分

石斛

一兩去根剉 桂

心三分

熟乾地黄

一兩

肉蓯蓉

三分酒浸一宿刮去皺皮炙乾

石為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空

心晚食前以溫酒下三十丸

補腎湯 治虛勞腎臟之損耳聾體瘦脚膝少力痛疼

磁石

二兩搗碎水淘去赤汁

牛膝

去苗桂心各一兩

黃耆

一兩半剉人

參

去蘆頭

白茯苓

獨活

芎藭

當歸

白芍藥

白朮

各一兩

白蒺藜

一兩微炒去刺

附子

一兩炮裂去皮臍

澤瀉

一兩 漢椒

一兩去目及閉口者炒出汗

右為末每服用羊腎一對切去脂膜以水一大盞半

煎羊腎至一盞去腎下藥末半兩更煎至六分去滓



空心及晚食前分暖為二服

肉蓯蓉丸 治虛勞腎氣不足耳聾

肉蓯蓉

一兩酒浸一宿  
刮去皺皮炙乾

黃耆

一兩

熟地黄

巴戟

各一兩  
枳殼三分  
微黃去瓢

白芍

五味子

白朮

各三分

右將八味為末入巴豆旋旋調和令勻次下熟蜜和杵數千下丸如梧桐子大每服空心以溫酒下二十丸至三十丸取溘利為度

桃仁散

出聖惠方

治虛勞積聚結塊心腹脇肋刺痛

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

川大黃

各二兩剉碎微炒

鼈甲

一兩塗醋

炙微黃去裙襴

當歸

一兩

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾炒微黃

訶梨勒

一兩

半煨用皮

荆三稜

一兩炮製

木香

桂心

各半兩

右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓食前稍

熱服忌葷菜生冷

鼈甲丸

出聖惠方

治虛勞積聚羸瘦不任

鼈甲

塗醋炙微黃去裙襴

肉桂

去皴皮

川大黃

剉碎微炒

訶梨勒

各二

兩煨用皮

牽牛子

微炒

荆三稜

炮製

桃仁

各一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

吳茱萸

半兩湯洗七遍焙乾微炒

白朮

一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空心以溫酒下三十丸加至四十丸忌茺菜生冷濕麵黃著湯治虛勞胸中客熱冷癖痞滿宿食不消吐噫脇間水氣或流飲腸鳴不生肌肉頭痛上重下輕目視恍恍惚惚志損常躁熱卧不得安少腹急小便赤餘瀝臨事不起陰下濕或小便白濁傷多

黃著

三人

參

一兩

芍藥

二兩

生薑

半斤

肉桂

三兩

大棗

十四枚

當歸

甘草

各一兩炙

右切以水一斗煮取四升分四服有寒加厚朴二兩

忌生葱海藻菘菜

白朮散

出聖惠方

治虛勞積聚堅實腹如鼓食即却吐卧不

安喘急

白朮

半兩

防葵

一兩

檳榔

郁李仁

湯浸去皮微炒

鼈甲

各二兩塗

醋炙微黃去裙襴

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒

桃仁

各三分湯浸去皮尖雙仁麩炒

微黃訶黎勒

一兩半煨用皮

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前溫服以微利為度忌葷菜生冷油膩

綠雲丸 治虛勞心下積聚元氣虛憊臍下冷疼

礪砂 研 硫黃 研 檳榔 剉各半兩 附子 炮製去皮臍二兩 荆三稜

煨剉 銅綠 研半兩 木香 半兩

右為末合研勻煮麵糊和丸如梧桐子大每服十丸  
煨生薑酒午夜卧服婦人血風當歸湯下

陳橘皮丸

出瑞竹堂

治虛勞堅癖腹脹羸瘦食久不消面萎

黃四肢少力

陳橘皮

湯浸去白焙

木香

厚朴

去麤皮薑汁浸

檳榔

生剉 硫黃

研細

大黃

剉炒各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒或

米飲下

鼈甲丸

治虛勞羸瘦癰塊不消

鼈甲

去裙襴醋炙

枳殼

去穰麩炒各二兩

大黃

剉炒一兩

白芍藥

一兩

半

右為末米醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸溫酒下日再

大黃湯 治虛勞積滯

大黃 劉甘草

各一兩

檳榔

四枚

皂莢

一挺不蛀者

右俱生用麤搗篩用童子小便五盞煎至三盞去滓露一宿分為三服空心一服至日午不動再服至申時不動更一服之動後將藥滓焙乾入木香半兩搗為末每服一錢溫米飲調下不計時候日服三

解勞散

出楊氏家藏方

治虛勞積氣堅硬噎塞胃膈引背徹痛

白芍藥

一兩半

柴胡

去苗

鼈甲

醋浸炙黃

枳殼

去穰麩炒已上各一兩

甘草

炙

赤茯苓

去皮各半兩

右㕮咀每服五錢水一盞半入生薑三片棗子一枚煎至七分溫服食後

虛勞癥瘕

附論

夫虛勞癥瘕病者皆由久寒積滯冷飲食不能消化所致也結聚牢強按之不轉動者為癥推之轉移則為瘕



也今虛勞人脾胃氣不能消化水穀復為寒冷所乘故結成此病也

方

烏頭丸

出聖惠方

治虛勞癥瘕心腹脹滿或氣喘咳嗽

川烏頭

一兩炮製去皮臍

桃仁

二兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

鼈甲

二兩

塗醋炙微黃去裙襴

吳茱萸

一兩湯浸七遍焙乾微炒

皂莢

三分去皮塗酥炙黃焦去

子陳橘皮

一兩湯浸去白穰焙

白朮

枳殼

麩炒微黃去穰

桔梗

去蘆

頭

檳榔

防葵

赤芍藥

乾薑

炮製剉

紫苑

洗去苗土

細辛

人參

去蘆頭

甘草

各一兩炙微黃剉

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空腹及晚食前以溫酒下二十丸

防葵散

出聖惠方

治虛勞癥瘕或氣攻脾胃令人心下及胃

管兩傍堅硬喘息急促牽引兩脇妨痛

防葵

荊三稜

各三分剉碎醋炒三遍

蓬莪朮

訶梨勒

煨用

皮檳榔

赤茯苓

人參

去蘆頭

白朮

桂心

枳

殼

麩炒微黃去穢

白芷

去皮

木香

川大黃

剉碎微炒各半兩

丁

香一分附子

半兩炮製去皮臍

郁李仁

三分湯浸去皮尖微炒

鼈甲二兩

洗去塵土用硃砂半兩研碎以醋二合浸硃砂去脚石塗醋炙鼈甲硃砂醋盡為度

右為散每服空心及晚食前以酒調下一錢忌葷菜

生冷濕麵

三稜煎丸

出聖惠方

治虛勞癥瘕心腹疼痛胃膈不利

荊三稜

八兩炮剉

陳橘皮

八兩湯浸去白穰焙

桃仁

四兩湯浸去皮尖雙仁研

如膏

已上四味除桃仁外搗羅為末用好酒五升於鍋中

以慢火煎次下桃仁膏熬如稀餚入後藥末

檳榔

訶梨勒

各二兩煨用皮

枳殼

四兩麩炒微黃去穢

木香

三兩

甲

二兩塗醋炙微黃去襴

硃砂

一兩研入

硫黃

二兩細研水飛過

附子

二兩

炮製去皮臍

乾薑

三兩炮製剉

右為末入研了硃砂硫黃等重研令勻入前藥內和

丸如梧桐子大每服空腹及晚食前以生薑湯或溫

酒下三十丸忌菹菜生冷

鼈甲散

出聖惠方

治虛勞癥瘕或攻心腹四肢無力不思飲

# 食

鼈甲

一兩半 塗醋炙  
微焦黃去裙襴

柴胡

一兩半  
去苗

乾薑

半兩 炮製剉

芎

窮

木香

三分

川大黃

剉碎  
微炒

荆三稜

一兩  
炮剉

陳橘皮

一兩

湯浸去  
白穰焙

訶梨勒

二兩 煨  
用皮

赤茯苓

一兩  
桃仁

一兩 湯浸  
去皮尖雙

仁麩炒  
微黃

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓食前稍熱服忌葷菜生冷濕麵

芫花丸

出聖  
惠方

治虛勞癥瘕久不瘥臍肋有塊形如盃或

如鷄子透隱皮膚或經年不消或疼痛如刺或堅硬  
如石能服此藥令自消化

芫花

二兩醋拌炒令乾

蓬莪茂

二兩炮剉

神麴

一兩炒令黃

麥蘖

一兩

炒微黃

鼈甲

二兩塗醋炙微黃焦去裙襴

荆三稜

二兩炮剉

白朮

一兩

蘇合

二兩麝香

一分

右為末醋煮麴糊和丸如梧桐子大每服空心及晚  
食前以溫酒下十丸忌生冷

白朮丸

出聖惠方

治虛勞癥瘕不能下食日漸羸瘦

白朮

防葵

木香

各一兩

檳榔

一兩

鼈甲

二兩 塗醋炙微黃焦

去裙襴

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

附子

炮製去皮臍

神麴

炒微黃

訶梨勒

各一兩 煨用皮

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空

心及晚食前以生薑湯下三十丸忌葷菜生冷

陳橘皮煎丸

出聖惠方

治虛勞癥瘕食不消化面色萎黃四

肢羸瘦喫食全少腹內常多冷氣大腸不調腰膝疼

痛

陳橘皮

一斤湯浸去白穢焙乾搗羅為末用附子酒一斗入於銀鍋中以慢火熬成膏

二兩炮製

去皮臍

三兩

荆三稜

三兩炮製

當歸

桂心

乾薑

炮製

桃仁

各三兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為末入前橘皮煎中和搗五七百杵丸如梧桐子

大每服空心及晚食前以清粥飲下三十丸

三稜鼈甲丸

出聖惠方

治虛勞癥瘕心腹冷氣胃脘煩痛臍

下多疼氣塊發即上搶心胃手足逆冷

荆三稜

一兩炮製

鼈甲

二兩塗醋炙微黃焦去裙襴

乾薑

炮製一兩

青



橘皮

一兩湯浸  
去白穰焙

蓬莪茂

芫花

醋拌炒  
令乾

川椒

各一兩去

目及閉口者  
微炒去汗

右為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服食前以生

薑湯下十五丸忌葷菜

硫黃丸

出聖  
惠方

治虛勞癥瘕腹脹飲食不消面無顏色四

肢羸瘦

硫黃

細研

木香

各一兩

厚朴

一兩半去麁皮塗  
生薑汁炙令香熟

陳橘皮

湯浸去  
白穰焙

神麴

炒微  
黃

桃仁

各一兩湯浸去皮  
尖雙仁麴炒微黃

檳榔

一兩

欽定四庫全書

普濟方  
卷二百三十四

三八

半

右為末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服食前以桃仁湯或溫酒下三十丸

鼈甲煎丸

出聖惠方

治虛勞癥瘕不消

鼈甲

一兩別搗羅為末

乾漆

搗碎炒令煙出

附子

炮製去皮臍

荊三稜

炮

川大黃

各一兩剉碎炒過

木香

半兩

右為末先將鼈甲末以頭醋三升煎令稠後入諸藥末和搗二三百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食

前以溫酒下十丸忌葷菜生冷

三神煎

出聖惠方

治虛勞癥瘕結塊不消者

桃仁

一千二百粒湯浸去皮尖雙仁研旋以水瀝取濃汁五升已來

荆三稜

二兩炮剉

鼈甲

三兩塗醋炙微黃去裙襴

右除桃仁外搗羅為末於鐺中先煎桃仁汁耗一半

下二味藥末以木篦不住手攪煎良久又下好酒三

味煎如稀餳收磁器中盛每日空心晚食前以熱酒

一中盞調下一茶匙忌葷菜生冷濕麵

虛勞浮腫

附論

夫腎氣不化則二陰不通故小便不利胃氣不足則肌肉開踈故皮膚浮腫腠者土也皮虛既不能制水腎者胃之關也關閉不利以水氣流溢於皮膚為腠腫也

方

人參湯 治虛勞四肢發腫飲食不進百節無力多卧少起

人參 赤茯苓

去黑皮

桑根白皮

剉炒

芍藥

秦艽

去苗

土半夏

湯浸去滑七  
通各一兩

鼈甲

去裙襴醋  
炙三兩

柴胡

土苗  
大腹皮

炮

木香

各一兩

荊三稜

醋浸炮搗  
碎二兩

甘草

炙

枳殼

去穰  
麩炒

分一

右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚同

煎至五分去滓溫服不拘時候

郁李仁散

出聖  
惠方

治虛勞通體洪滿腹堅脹喘急不能飲

食

郁李仁

湯浸去白  
皮尖微炒

川大黃

各一兩  
剉碎微炒

柴胡

土苗  
澤瀉

赤芍藥

猪苓

各三分  
去黑皮

杏仁

湯浸半兩去皮尖  
雙仁麩炒微黃

桑根白皮

三分  
剉

鼈甲

一兩塗醋炙  
令黃去裙襴

赤茯苓

半兩  
桔梗

去蘆  
頭

麻黃

各三分  
去根節

右為散每服三錢以水一盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服

五味子湯 治虛勞四肢浮腫氣急大小便不利坐卧

不安

五味子

炒

黃耆

剉

枳殼

去穰  
麩炒

大腹

微煨  
剉

桑根白皮

炙桂皮去粗 檳榔煨 白朮 陳橘皮各一兩湯浸去白炒 厚朴

去麋皮生 薑汁炙熟 防已各一兩半

右龕搗篩每服三錢水一盞半煎至七分去滓空心溫服日晚再服微利即止

漢防已散出聖惠方 治虛勞四肢浮腫喘息促小便不利坐

卧不安

漢防已 猪苓各三分去黑皮 海蛤 木通各一兩剉 陳橘皮

一兩湯浸 木香 白朮各半兩 桑根白皮剉 赤茯苓

各三分  
紫蘇莖葉  
檳榔 各一兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

前胡丸

出聖惠方

治虛勞四肢浮腫心胃滿悶不欲飲食

前胡

一兩去蘆頭

旋覆花

半兩

人參

三分去蘆頭

檳榔

一兩

木香

陳橘皮

各半兩湯浸去白穰焙

訶梨勒皮

一兩

赤茯苓

桑

根白皮

各三分判

桂心

半兩

郁李仁

一兩湯浸去皮尖微炒

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服煎



薑棗湯下三十丸日三服

大腹皮湯 治虛勞身體浮腫上氣喘促小便不利

大腹皮

剉

檳榔

煨剉

前胡

去頭

赤茯苓

去黑皮

防己

陳橘皮

湯浸去白焙

赤芍藥

各一兩

甘草

半兩

桑根白皮

炙剉

木通

各二兩

剉

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至五分去滓溫服日

二

桑白皮湯 治虛勞脾氣弱水液妄行四肢浮腫小便

不利

桑根白皮

炙剉

猪苓

去黑皮

滑石

碎

木通

剉

郁李仁

湯浸

去皮  
尖炒

赤茯苓

去黑皮各  
一兩半

陳橘皮

湯浸去  
白半兩

檳榔

微煨  
三枚

澤瀉

三分

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

細辛散

治虛勞心胃壅悶喘促四肢浮腫

細辛

半兩

枳殼

三分麤炒  
微黃去穢

漢防己

桂心

各半兩

黃耆

一兩  
剉

白朮

赤茯苓

赤芍藥

各三分

當歸

半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

木香散

出聖惠方

治虛勞損臍下痛抽腎入腹四肢浮腫

木香

五加皮

各一兩

松節

二兩剉

桑根白皮

一兩剉

薏

杏仁

三分

檳榔

桃仁

各一兩湯浸去皮尖雙仁麤炒

陳橘皮

三分湯浸

去白穰微炒

郁李仁

一兩湯浸去皮尖微炒

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候稍熱服

陳橘皮丸

出聖惠方

治虛勞心胃壅悶喘促大小便不利四

肢浮腫

陳橘皮

二兩湯浸去白穢焙

紫蘇子

三分微炒

漢防已

甘遂

各半

兩煨微黃

桑根白皮

剉 甜葶藶

隔紙炒令紫黃

赤茯苓

木通

各一兩剉 郁李仁

一兩湯浸去皮尖微炒

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以薑棗湯下二十丸

赤茯苓湯

治虛勞偏身浮腫心腹氣脹大小便澀

赤茯苓

去黑皮

防已

檳榔

煨剉

桑根白皮

剉

甜葶藶

隔紙炒令紫色

木通

剉

陳橘皮

湯浸去白穰焙

郁李仁

湯浸去皮炒各一兩

右麋搗篩每服三錢水一盞半煎至七分去滓食前溫服以大小便利為度

人參湯 治虛勞却氣臍腹及面目浮腫

人參

一兩 鼈甲

醋浸去裙襴炙黃二兩

柴胡

去苗

當歸

切焙

枳殼

去穰

麋炒用

甘草

炙剉各一兩

白檳榔

一枚剉

桃仁

七十枚湯浸去皮尖別研

右麋搗篩每服三錢童子小便一盞浸一宿平旦煎

至七分去滓空心溫服若女人病加牛膝一兩

防已丸 治虛勞脾腎不足身面浮腫卧即脹滿喘痰

嗽胃膈痞悶大小便不利漸成水氣

防已

一兩半

杏仁

去皮尖雙仁  
麩炒三分

赤茯苓

去黑皮

郁李仁

湯浸去皮  
尖麩炒

紫蘇葉

各一兩

苦葶藶

炒香三分

陳橘皮

湯浸

去白焙  
一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心食前溫酒下三

十丸

麻仁散

出聖惠方

治虛勞四肢浮腫

大麻仁

商陸

防風

去蘆頭

附子

炮製去皮臍

陳橘皮

湯浸去白穰焙

漢防已

各一兩

右為末每服五錢以水一大盞入赤小豆一百粒煎至五分去滓食前溫服

虛勞目暗

附論

夫肝候於目而臟於血血為榮養於五臟今臟腑已有勞傷則血氣俱虛五臟既虛則不能榮養於目故令昏

暗也

方

還睛丸

出聖惠方

治虛勞目暗

兔絲子

一兩酒浸三日曝乾別搗為末

真粉

三分細研

遠志

去心防風去蘆

頭蔓荊子

車前子

各半兩

石斛

去根剉

白茯苓

各一兩

玄參

人參

去蘆頭

木香

決明子

地膚子

麩

仁

湯浸去赤皮

芎藭

羌活

羚羊角屑

各半兩

熟乾地

黃一兩  
兩  
枸杞子

半兩  
兩  
牛膝

去苗

薯蕷

甘菊花

黃耆



判地骨皮

各半兩

覆盆子

分三

兔肝

二兩炙微黃

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食

前以溫酒下三十丸粥飲下亦得忌熱麵葷辛生冷

羚羊角丸

出聖惠方

治虛勞之弱四肢無力頭目昏暗身體

疼痛不欲喫食

羚羊角

分三

鹿茸

一兩半塗酥炙

山茱萸

防風

各三分去蘆頭

牛

膝

一兩半去苗

肉苁蓉

一兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾

薯蕷

蜜蒙花

當歸

各三分

白茯苓

一兩

黃耆

判三分

兔絲子

一兩酒浸三日

曝乾別  
搗為末

人參

三分去蘆頭

五味子

半兩

桂心

三分

細辛

地

膚子

甘菊花

決明子

青箱子

各半兩

梨乾地

黃

附子

各一兩炮製去皮臍

甘草

半兩炙微赤判

磁石

二兩燒醋淬七遍搗

碎細研  
水飛過

車前子

三分

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服以  
溫酒下三十丸日服三棗湯下亦得忌炙燒熱麵葷

辛

車前子丸

出聖惠方

治虛勞氣目昏暗身體少力

車前子

一兩

磁石

二兩燒醋淬七遍  
搗碎細研水飛過

石斛

一兩去根剉

兔

絲子

二兩浸酒三日  
曝乾別搗為末

熟乾地黄

遠志

去心澤瀉

牛膝

各一兩  
去苗

桂心

半兩

蒺藜子

微炒  
去刺

白茯苓

山茱

萸五味子

各一兩

巴戟

一兩半

肉蓯蓉

一兩酒浸一宿刮去皺皮

乾甘草

半兩炙  
微赤剉

黃耆

人參

各一兩  
去蘆頭

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空

心及晚食前以鹽酒下三十丸

磁石丸

出聖惠方

治虛勞目暗

磁石

一兩半燒醋淬七遍  
搗碎細研水飛過

硃砂

細研水飛過

補骨脂

各半

兩微炒

肉苁蓉

酒浸一宿刮去皺皮炙乾

神麴

各三分炒令微黃

遠志

去心

木香

覆盆子

五味子

各半兩

乾熟地黃

三分巴戟

桂心

各半兩

牛膝

去苗石斛

各三分去根節

甘草

炙微赤剉

薯蕷

車前子

各半兩

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧

桐子大每服食前煎黃耆湯下三十丸

地膚子丸

出聖惠方

治虛勞眼痛淚多不明

地膚子

半兩

川大黃

一兩剉碎微炒

栢子仁

三分

麝仁

半兩去皮

決

明子

三分

甜瓜子

青箱子

各半兩

白蒺藜

三分微炒去刺

荒

蔚子

半兩

藍子

三分

兔絲子

一兩

酒浸三日曝乾別搗為末

黃連

去細鬚

辛

桂心

螢火蟲

各三分

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每空心

不計時候以粥飲下二十丸忌生冷猪肉熟麵葷辛

兔肝丸

出聖惠方

治虛勞肝腎風虛眼膜昏暗不能久視無

力

兔肝

二兩炙微黃

防風

三分去蘆頭

玄參

白茯苓

各一兩 鈴

羊角屑

三分

人參

去蘆頭

決明子

各三分

車前子

一兩 地骨

皮枳殼

半兩麩炒微黃去穰

黃耆

一兩

熟乾地黄

一兩

甘菊

花麥門冬

一兩半

去心焙

右為末煉蜜和搗丸如梧桐子大每服食前以溫粥

飲下三十丸

肉蓯蓉丸

出聖惠方

治虛勞目暗遠視無力四肢乏弱

肉蓯蓉

二兩酒浸一宿刮去皴皮炙乾

薯蕷

巴戟

車前子

黃耆

劉

覆盆子

各一兩

犀角屑

半兩

兔絲子

一兩

酒浸

別搗為末

山茱萸

一兩

熟乾地黄

二兩

人參

去蘆頭

牛膝

去苗

續

斷

各一兩

甘菊花

一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前以粥飲下三十丸忌生冷油膩熱麵

羚羊角散

出聖惠方

治虛勞肝腎風虛頭昏目暗四肢少力

羚羊角屑

半兩

黃耆

一兩

柴胡

一兩半

防風

一兩

去蘆頭人

參

三分去蘆頭

附子

一兩

炮製

澤瀉

三分

山茱萸

覆盆

子 決明子 車前子 青柏子

各一兩

甘草

半兩 炙微

赤 判

右為末每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

防風散

出聖惠方

治虛勞肝氣乏弱四肢不收筋骨疼痛目

多昏暗

防風

去蘆頭

山茱萸

羚羊角屑

各三分

枳殼

半兩 麩炒赤判

黃耆

三分 判

白茯苓

一兩

羌活

三分

黃芩

半兩

當歸

三分 麥門



冬一兩半 五味子半 薏苡仁半

去心焙

兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓溫服

日三四服

黃耆散

出聖惠方

治虛勞益肝明目

牛膝

一兩去苗

附子

一兩炮製去皮臍

牡蠣粉

三分澤瀉

一兩乾薑

三分炮製

兔絲子

二兩酒浸三日曝乾別搗為末

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空

心及晚食前以溫酒下三十丸

白羊肉湯

治虛勞羸瘦脚膝無力耳聾盜汗心多怯

悸

白羊肉

二斤去脂膜以水四升煮取二升

杜仲

一兩去麋皮炙微黃判

白茯苓

苓

一兩

熟乾地黄

一兩判

牛膝

去苗

人參

去蘆頭

黃耆

判

白

朮

各一兩

桂心

三分磁石

三兩搗碎水淘去赤汁

龍骨

一兩

遠志

一兩

去心

右為散每服四錢用羊肉汁一中盞煎至六分去滓

食前溫服之

地黄湯 治虛勞耳聾及虛鳴

熟地黄

一兩

磁石

二兩 搗碎水淘去赤汁

防風

三分 去蘆頭

羌活

三分

黃耆

一兩 剉

白芍藥

木通

剉

桂心

各三分

人參

一兩 去蘆

頭

右為末每服用羊腎一對切去脂膜以水一大盞半煎至一盞去腎入藥末半兩煎至六分去滓空心及晚食前分煖為二服

菖蒲浸酒方 治虛勞耳聾

菖蒲

三分

木通

二兩剉

磁石

五兩搗碎水淘去赤汁

防風

去蘆頭桂

心

各三兩

牛膝

三兩去苗

右為細剉用生絹袋盛以酒一匙內藥浸七日後每日食前煖一小盞服之

普濟方卷二百三十四

欽定四庫全書

普濟方卷二百三十五

明周王朱櫛撰

勞瘵門

總論

夫骨蒸殭瘵復連屍瘵勞瘵蟲瘵毒瘵熱瘵冷瘵食瘵  
鬼瘵等皆曰傳屍者以瘵者瘵也病自上瘵下與前人  
相似故瘵其變有二十一種或三十六種或九十九種  
大畧令人寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁髮乾而聾或

腹中有塊或腦後邊兩有小結核連復數箇或聚或散沉沉默默咳嗽痰涎或咳膿血如肺痿肺癰狀或腹下利復羸瘦困乏不時積月累年以至於死死後乃瘥易傍人乃至滅門者是也更有蜚尸遁尸寒尸喪尸瘥尸謂之五尸及大小附着等證不得知所苦無處不惡乃挾諸鬼邪而害人以三因權之內非七情所忤外非四氣所襲雖若麗乎不內外因奈其證多端傳變遷移難以推測故自古及今愈此病者十不得一所謂狸骨

賴肝天靈蓋銅鑑鼻徒有其說未常見效唯膏肓崔氏灸穴若早灸之可活幾半晚則不濟也○病者憎寒發熱自汗面白目乾口苦精神不守恐懼不能獨卧其傳在肝病者憎寒發熱面黑鼻燥忽忽喜忘大便苦難或復泄瀉口瘡其傳在心病者憎寒發熱面青唇黃舌本強不能嚥飲食無味四肢羸瘦吐涎沫傳在脾病者憎寒發熱面赤鼻白乾燥毛折咯嗽喘氣時吐白涎或有血線傳在肺病者憎寒發熱

面黃耳輪焦枯筋骨痠痛小便白濁遺瀝胸痛其  
傳在腎所謂勞蒸者二十四種隨證皆可考尋  
毛折髮焦肌膚甲其蒸在皮外人覺熱自反惡寒  
身熱暍劇其蒸在肉髮焦鼻衄或復尿血其蒸在  
血身熱煩燥痛如針刺其蒸在脉爪甲焦枯眼昏  
兩脇急痛其蒸在筋版齒黑燥大杼酸疼其蒸在  
骨背脊疼痛胛骨酸癢其蒸在髓頭眩熱悶口吐  
渴涎眼多眵淚其蒸在腦男子失精女子白淫其蒸



在玉房乍寒乍熱中脘與臌中煩悶其蒸在三焦小便  
赤黃凝濁如膏其蒸在膀胱傳道不均或泌或泄腹中  
雷鳴其蒸在小腸大腹隱痛右鼻乾疼其蒸在大腸口  
鼻乾燥腹脹睡卧不安自汗出其蒸在胃口苦耳聾脇  
下痛其蒸在膽裏急後重肛門濇閉其蒸在回腸小腹  
疔痛筋脉縱緩陰器自強其蒸在宗筋眼昏淚下時復  
眩暈躁怒不常其蒸在肝舌焦黑氣短躁悶洒洒淅淅  
其蒸在心唇乾口瘡胸腹悶滿畏寒不食其蒸在脾咳

嗽喘滿咯痰吐血聲嘶音遠其蒸在肺耳輪焦枯脚氣  
酸疼起居不得其蒸在腎情想不寧無故精泄白物綿  
綿而不舉其蒸在右腎心主胞絡心膈噎塞攻擊痛疼  
俛仰煩冤其蒸在膈諸證雖曰不同其根多有蟲齧其  
心肺治之不可不絕其根也○外臺秘要病源云夫蒸  
有五一日骨蒸其根在腎旦起體涼日晚即熱煩躁寢  
不能安食都無味小便赤黃忽忽煩亂細喘無力腰疼  
兩足逆冷手心常熱蒸盛傷內即變為疳食人五臟二

曰脉蒸其根在心日增煩悶擲手足出翕翕思水口唾  
白沫卧即浪言或驚恐不定脉數蒸盛之時或變為疳  
臍下悶或暴利不止三日皮蒸其根在肺必大喘鼻乾  
口中無水舌上白小便赤如血蒸盛之時胸滿或自稱  
得症熱兩脇下脹大咳徹背連脾疼眠寐不安或蒸毒  
傷臟口內唾血四白肉蒸其根在脾體熱如火煩躁無  
汗心腹鼓脹食即欲嘔小便如血大便秘瀉蒸盛之時  
或體腫目赤寢卧不安五日內蒸亦名血蒸所以名內

蒸者必外寒而內熱把手附骨而熱盛其根在五臟六腑其人必因患後得之骨肉自消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起○大凡男女傳屍之病心胸滿悶背轉疼痛兩目不明四肢無力雖欲寢卧卧不得寢者脅急膝痛膝腦痠痛多卧少起狀如佯病每至平旦精神尚好日午後四肢微熱面無顏色喜見人過常懷忿怒纔不如意又便多噉行立脚弱夜卧盜汗夢與鬼交或見先亡或多驚悸有時咳嗽雖思飲

食不能多食死在須臾精神尚好或時微利兩脇虛脹  
口燥鼻乾常多粘唾有時唇赤有時欲睡漸成沉羸猶  
若涸魚不得死矣其病變狀多端考其原先從腎起初  
受之氣兩脰痠疼腰背拘急行立脚弱腎已受矣次傳  
其心心受其氣夜卧必驚或多怔忡心懸汲汲夢見先  
亡有時盜汗飲食無味口内生瘡心常煩熱惟欲眠卧  
朝輕夕重兩頰口唇悉皆紅赤如傅臘脂又時手足五  
心皆熱心皆受已次傳於肺肺初受氣咳嗽少力有時

氣喘卧則更甚鼻口乾燥不聞香臭或時聞朽腐物氣  
憤憤欲吐肌膚枯燥時或刺痛或似蟲行乾皮細起狀  
如麤片肺既受已次傳於肝肝初受氣兩目眦眦面無  
血色常欲顰眉眼視不遠目睛乾又時赤痛或復睛黃  
朝暮瞽瞍常常合眼眠卧不熟肝既受已次傳於脾脾  
初受氣兩脇虛脹食不消化又時瀉利水穀生蟲有時  
肚痛腹脹雷鳴唇口焦乾或生瘡腫毛髮乾聳無有光  
澤或時上氣擡眉喘氣痢赤黑汁至此候者將死證矣

大凡此疾良由祖先積孽殺害過多或有命債殃及後世或淪沒惡趣未應解脫為人之後不為釋冤不為薦福或患此而亡傳染是疾以希資救又其家人久不營塋不時祭祀山水衝注狐狸穿犯幽宅不寧出而為祟遂成相傳傳染不已○傳尸非惟一門相染而成也人之氣血衰敗臟腑虛弱中於鬼氣因感其邪遂成此疾其候咳嗽不已或胸膈妨悶或肢體疼痛或肌膚消瘦或飲食不入或吐利不定或吐膿血或吐鮮血動至一

二升或嗜水漿或好歌詠或愛悲愁或發癲歇或便溺  
艱難或因酒食而遇或因風雨而來或問病弔喪而得  
或朝走暮遊而逢或因氣聚或因血行或露卧於田野  
或偶會於園林傳惹斯疾○傳尸者須知三尸九蟲何  
也三尸者名在後論九蟲者烟蟲寸白胃蟲人皆可治  
之其餘六蟲有六代行在後人若受一蟲此人死後兄  
弟子孫骨肉親屬綿綿相傳以至滅族九疾始覺精神  
不美氣候不調切戒慎酒色調節飲食如或不然妄言



邪師或言鬼祟以至不起慎之戒之○尸蟲遊食日辰  
及治法大抵六蟲一旬徧遊四穴轉流週而復始已具  
六代法中自立春一日後食起三日一食五日一醉歸  
于所歸穴大醉五日故五日蟲醉可以下藥及灸其三  
日蟲食切不可妄有醫治蟲在人身中一蟲可占十二  
穴六蟲在人身中共遊七十二穴上旬十日從心至頭  
遊四穴中旬從心至臍遊四穴下旬從臍至足遊四穴  
上旬可先服藥後灸所遊穴其蟲頭上向若下火灸蟲

如紫蠶苗出在汗中更服藥取之以蟲盡為度便服補藥永得安耳中旬其蟲所遊穴中頭向下亦服藥取之不灸也恐蟲覺晤永難取蓋此蟲性已通靈務在精審勿令有悟可也○觀尸蟲色知病淺深凡明醫知者先知毒氣與蟲並行攻人臟腑遇陽日長雄蟲遇陰日長雌蟲因先食臟腑脂膏故其色白次食血肉血肉盡故其蟲黃赤次食精髓故其蟲紫色精髓盡故其蟲黑色傳入腎中病人方死若求醫士曉通病源先取其蟲視

其理自知輕重其蟲如白色可二十日服藥補之其蟲如黃赤色可六十日服藥補之其蟲如紫黑色此疾已極可百二十日服藥補之十中可保一二雖不能為一身除害亦可為子孫除害矣服藥仍須一載之中刻意調攝亦可痊平如此得命可為再生也又云蟲頭赤者食患人之肉其病可治頭口白者食患人之髓其病難治雖不得斷則不傳子孫矣○六代傳病及諸蟲形狀允治病之道要須藥病相應神效仍在瀉實補虛調治臟

腑方得痊愈故三尸九蟲種種靈異莫令知之或似蜥  
蜥或似紅線馬尾或似蝦蟆形或似刺蝟或似鼠行或  
如爛麪或有足無頭或有頭無足或化精血歸在亢陽  
之內種種形類實難辨之淺學之流難施及劑誤醫甚  
多枉死不少或則取蟲不補或則學淺妄傳皆是徒費  
資財通無去病之理遂致夭折豈不悲哉

出危  
氏方

圖  
闕

此蟲在人身中如嬰兒之狀背上毛長二寸

闕圖

此蟲變動形如鬼在人臟腑中

闕圖

此蟲形如蝦蟆變動在人臟腑中

上三蟲在人身中染着之後或大或小令人夢寐顛倒

魂魄飛揚精神耗散飲食漸減形容漸羸四肢痠痛百  
節勞倦憎寒壯熱背膊拘急腦與頭痛口苦舌乾面無  
顏色鼻流清涕虛汗常多行步艱難眼睛多痛其蟲過  
丙丁日食起醉歸心腧穴中四穴輪轉周而復始大醉  
可醫矣取蟲出後補心當瘥

第二代并尸蟲形狀遊食日治法第二代為覺勞病謂  
傳受此疾已覺得病覺病者患乃自知夜夢不解與亡  
人為伴侶醒後全無情思昏惰似醉神識不安所嗜食

味輒成患害或則氣發動風所加四體不和心胸滿悶  
日漸羸瘦骨節乾枯或嘔酸水或則醋心唇焦口乾鼻  
塞腦痛背膊酸疼虛汗常出腰膝刺痛知此疾狀早須  
醫治失時致傷命

出危氏方

圖  
關

此蟲形如亂髮可長三寸或似守宮

此蟲形如蜈蚣在人臟腑中

圖關

此蟲形如蝦在臟腑中

上三蟲在人身中令人氣喘唇焦口乾咳嗽憎寒心煩壅  
滿毛髮焦落氣脹吞酸津液漸衰次多虛竭鼻多清水  
四肢將虛臉赤面黃皮膚枯瘦腰膝無力背脊痠痛吐



血唾膿語聲不利鼻塞腦痛胞膈多痰重者心悶吐血  
強倒在地不能自知其蟲遇庚辛日食起歸肺膈中四  
穴輪轉周而復始大醉可醫矣灸取蟲後補肺當瘥  
第三代病并尸蟲形狀遊食日治法第三代為傳尸勞  
病傳受病人自得之日漸羸瘦頃改容顏日日憂惶夜  
夜恐懼不遇良醫就死不遠

出危  
氏方

圖  
關

此蟲形如蚊蟻在人身中俱遊臟腑

圖關

此蟲形如蜣螂在人身中俱遊臟腑

圖關

此蟲形如刺蝟在人三焦

上三蟲在人身中令人三焦多昏日常思睡嘔吐苦汁

或吐清水粘涎腹脹虛鳴卧後多驚口鼻生瘡唇黑面  
青日漸消瘦精神恍惚魂夢飛揚飲食不消氣咽氣乾  
汗出如油目昏多淚其蟲遇庚寅日食起醉歸厥陰穴  
中四穴輪轉周而復始大醉可醫矣取其蟲出後補陰  
當瘥

第四代病并尸蟲形狀遊日治法

出危氏方

圖關

此蟲形如亂絲在人臟腑中

闕圖

此蟲形如猪肝在人臟腑中

闕圖

此蟲形如蛇在人臟腑中

上三蟲在人身中令人臟腑虛鳴嘔逆腸中疰瘕氣塊

憎寒壯熱肚大筋生腰背疼痛或虛或瘦瀉痢無時行  
履困重四肢憔悴時氣上喘口苦皮乾飲食過多要喫  
酸醎之物其蟲遇戊巳日食起醉歸脾腧穴中四穴輪  
轉周而復始大醉可醫矣取出蟲後補脾當瘥

第五代病并尸蟲形狀遊食日治法

出危氏方

圖  
闕

此蟲形或有足無頭或有頭無足

關圖

此蟲形如鼠在人身中俱遊臟腑

關圖

此蟲形如精血變動在人臟腑或在陽宮

上三蟲在人身中令人多怒氣逆筋骨拳變四肢解散  
面黑面青憎寒壯熱腰背疼痛起坐無力頭如斧斫眼

睛時痛翳膜多淚背膊刺痛力憊身羸手足乾枯卧著  
床枕不能起手足似中風四肢頑麻腹內多痛眼見黑  
花忽然倒地不省人事夢寐不祥覺後遍體虛汗其蟲  
遇甲子日食起醉歸肝腸穴中四穴輪轉周而復始大  
醉可醫矣取蟲出後補肝當瘥

第六代病并尸蟲遊食治法

圖  
闕

此蟲形如馬尾有兩條一雌一雄

圖關

此蟲形如鼈在人臟腑

圖關

此蟲形如爛麤或長或短

上三蟲在人身中居於腎臟透連脊骨令人思食是物



要食身體尪羸腰膝無力髓寒骨熱四肢枯乾眼見火  
生或眼多黑暗耳內虛鳴陰濕燥痒冷汗如油夢與鬼  
交小便赤黃醒後昏沉臍下結硬或奔心胸看物如艷  
心腹悶亂骨節疼痛其蟲遇丑亥日食起醉歸腎腧穴  
四穴輪轉周而復始大醉可醫矣蟲出後補腎填精當  
瘥

取蟲防護法

先令病人家用好紙糊一密室不留些罅隙尋志誠

人過遞以安息香水灑了過遞人之身又以雄黃雌黃塗其鼻孔耳眼唇上安排鉄鉗一箇布巾一幅用香油二觔以鍋盛頓微煎令沸仍用高桶一箇以好石灰在桶内生布巾蓋桶口却服取蟲藥五更初一服五更三點一服服藥後腹中疼痛如刀斧劈不妨至巳牌必須下蟲或取下臭穢如膠漆或吐瀉膿血癥塊皆於灰桶中其蟲或從汗出紫蠶苗狀或於耳鼻口中出或小便中出異般形狀不止一也或青黑

或黃紅大者急用鐵鉗取於油內煎當日將油紙裹  
蟲入瓦罌內石灰填實埋棄於深山遠僻處免致再  
染人患人衣服床蓆並皆棄去醫人吩咐藥後亦須  
遠去

論

論曰夫勞瘵一證為人之大患凡受此病者傳變不一  
積年痼易甚至滅門可勝嘆哉大抵合而言之曰傳屍  
別而言之曰骨蒸殭殍復連屍痼勞痼蠱痼毒痼熱痼

冷症食症鬼症是也夫症者症也自上症下病源無異是之謂症又其變則有二十二種或三十六種或九十九種又有所謂五屍者曰蜚屍遁屍寒屍喪屍注屍是也其名不同傳變尤不一感此疾而獲安者十無一二也大九五臟所傳皆令人增寒發熱其證狀各異有如傳之於肝則面白目枯口苦自汗心煩驚悸傳之於心則面黑鼻乾口瘡喜忘大便或秘或泄傳之於脾則面青唇黃舌強喉哽吐涎體瘦飲食無味傳之於肺則面赤

鼻白吐痰咯血嗽喘毛枯傳之於腎則面黃耳枯胸滿  
肝痛白濁遺瀝又有二十四種勞蒸者亦可因證驗之  
蒸在心也少氣煩悶舌必焦黑蒸在小腸也腹內雷鳴  
大腸或秘或泄蒸在肝也目昏眩暈躁怒無時蒸在膽  
也耳聾口苦脇下堅痛蒸在腎也耳輪焦枯腰脚痠痛  
蒸在右腎也情意不定泄精白絮蒸在肺也喘嗽咯血  
聲音嘶遠蒸在大腸也右鼻乾疼大腸隱痛蒸在脾也  
唇口乾燥腹脇脹滿畏寒不食蒸在胃也鼻口乾燥腹

膨自汗睡卧不寧蒸在膀胱也小便黃赤凝滑如膏蒸  
在三焦也或寒或熱中脘膈中時覺煩悶蒸在膈也心  
胸噎塞疼痛不舒蒸在宗筋也筋脉縱緩小腹隱痛陰  
氣自強蒸在回腸也肛門秘澀傳道之時裏急後重蒸  
在玉房也男子遺精女子白淫蒸在腦也眼眇頭眩口  
吐濁涎蒸在皮也肌膚鱗起毛折髮焦蒸在骨也版齒  
黑燥大杼痠疼蒸在髓也肩背疼倦胛骨痠疼蒸在筋  
也眼昏脇痛爪甲焦枯蒸在脉也心煩體熱痛刺如針

蒸在肉也。自覺身熱多，不奈何。四體暈動，蒸在血也。毛髮焦枯，有時鼻血或復尿血，詳諸病證大畧如斯。若究其根，惟心肺受蟲蠹禍之甚也。治法先宜去根，次須攝養。亦有早灸膏肓、崔氏穴而得愈者。若待其根深蒂固而治之，則無及矣。平時得三五方用之，頗驗。謾錄於左，以為備治。○論曰：傳尸勞者，骨蒸之病，流傳五臟也。其證：淹蹠半卧，半起旦即醒，然午後微蒸，情常不悅，心多驚悸，夜即盜汗，夢與鬼交，兩頰紅赤，唇如血色，欲醒不

得眠欲食不能食或喘氣咳嗽心胸滿悶背體煩疼兩目精明四肢無力脊脊拘急膝脛痠疼兩脇虛脹時或微利鼻口乾燥漸至尪羸雖死在須臾精神尚爽是其候也治之若緩猶如水涸不覺其死。近世以來童男室女丈夫婦人月水不調臍腹冷痛五心煩熱醫者一見便作骨蒸勞證治之病者聞之莫不驚駭殊不知人本無勞證皆緣稟受怯弱血氣不足治之不得其法用藥不善遂成此疾且多以柴胡地骨皮青蒿知母藕節



鼈甲紫苑麥門冬為退熱之劑已服之後熱雖漸退未  
久復來醫者便究本原不詳醫書所謂虛熱語再用前  
件等藥愈進而血氣愈虛疾勢已甚矣况前藥性冷必  
傷脾胃日復一日不思飲食以致腸胃滑泄肢體瘦悴  
以致不救此乃柴胡等藥悞之矣深可憐憫蓋柴胡等  
藥乃傷寒表肝之劑若血氣虛者非所宜服向來必用  
方中亦曾言之但其辭文隱而難曉今明言其畧庶幾  
易知若受病之人未曾服前件藥尤為易治已曾服後

倘或過多真氣表盡難以收救宜服宜神飲。凡患骨蒸之人坐卧居處不宜傷冷亦不得傷熱冷甚則藥氣難通煎之脹滿食不消化或膈氣上熱甚則血脉擁塞頭眩目疼唇乾口燥心胸煩悶渴欲飲水此等皆是將息過度之狀深可誡也將養之法須寒溫得所先熱而脫先寒而着若背傷冷即令咳嗽若手足傷熱即令心煩若覆衣裳後即眠卧盜汗若覆衣過薄即心腹脹滿所以飲食不限時節寧可少食保無宿注數數進之助

藥勢也必須以軟易消故也不宜生硬恐損胃氣致不  
消也此皆以易消食之為瘥○骨蒸之病無問男女忌  
房室舉動勞作有所不宜陳臭酸鹹粘食不消牛馬驢  
羊大小二豆猪魚油膩酒麪瓜菓野鳥之屬葵笋蒜蕨  
及生冷等並不得食自必平復一月以後乃漸開也大  
畧如此觸類而長之此病宜食煮飯鹽豉豆醬薑葱韭  
枸杞苜蓿苦菜地黃牛膝並須煮爛食之候病稍退恐  
肌膚虛弱可時食乾鹿脯

治諸疾藥性

出拔  
粹方

實熱

黃芩

黃連

黃蘗

大黃

氣

烏梅

秦艽

柴胡

血

青蒿

鼈甲

蛤蚧

小麥

牡丹皮

肺鼻乾

烏梅

天門冬

紫苑

麥門冬

皮

白舌  
吐血

石膏

桑白皮

膚

昏昧  
氣睡

牡丹皮

氣

遍身氣熱  
悶促鼻乾

人參

黃芩

梔子

大腸

口鼻孔乾痛

大黃

芒硝

脉

唾白浪語脉絡溢脉緩急不調

生地黃

當歸

心

乾舌

黃連

生地黃

血髮地黃

童子小便

當歸

桂心

小腸

下唇焦

赤茯苓

生地黃

木通

脾

唇焦

芍藥

木瓜

苦參

肉

食無味而嘔煩躁不安

芍藥

胃

舌下痛

石膏

粳米

大黃

芒硝

葛根

肝黑眼川芎 當歸 前胡

筋甲黑川芎 當歸

膽眼白赤色柴胡 枳實

三焦乍寒乍熱石膏 竹葉

腎兩耳焦生地黃 寒水石 石膏 知母

腦頭眩悶熱地黃 防風 羌活

髓沸骨中熱天門冬 當歸 地黃

骨齒黑腰痛足逆變且食臍豔甲 地骨皮 牡丹皮 當歸

生地黃

肉

肢細  
臍俱腫

石膏

黃蘗

胞

赤小便  
黃

澤瀉

茯苓

沉香

滑石

生地黃

膀胱

左耳  
焦

澤瀉

茯苓

滑石

凡此諸蒸皆熱病後因食肥肉油膩及房酒犯之而成久蒸不除變成勞瘵即死矣

勞瘵

附論

勞瘵之證非止一端其始也末有不因氣體虛弱勞傷

心腎而得之又  
有外感風寒熱濕之氣  
先為瘥疾以致  
咳嗽寒邪入裏失於調治  
不能保養過於房勞傷於飲  
食久而成勞瘵之後其為證者  
令人肌肉羸瘦毛皮乾  
枯寒熱盜汗遺洩白濁或腹中  
有塊或腦後兩邊有小  
結核或聚或散或咳嗽痰涎或  
咳唾膿血及傳變則為  
二十四種或三十六種或九十九種  
又有所謂五尸者  
其名狀雖不同傳變雖不一  
其實所傷不過五臟諸方  
所載皆云有蟲嚙心肺間治法  
先當去然後調養五臟



至若傳尸一證名骨蒸殭蹠復連屍疰勞疰蟲疰毒疰  
冷疰食疰鬼疰是也如勞瘵多是血氣虧損多因輕病  
時發汗通利差誤所致或感六氣成咳嗽未解散先服  
補藥竟成久咳復以房勞恣飲強食變為寒熱只宜服  
平補之藥又有能倍食肉思食者名曰傳屍亦有滅門  
者其藥雖有天靈蓋紫河車狐肝獺爪麝香等自未及  
用世云有鬼依其身有蟲蝕其臟婦人多病此蓋於產  
後閉經而傳之耳

方

木香蛤蚧丸

指出直指方

治勞瘵久嗽聲乾骨痿瘦痺

蛤蚧

一對尾全者洗淨酥炙

生鼈甲

去裙醋炙乾

白茯苓

川芎

當歸

北五味子

牛膝

各七錢半

綿黃芪

柴胡

知母

貝母

鷄心檳榔

明阿膠

炒酥

巴戟

酒浸去心曬

桃仁

酒浸去皮尖各五錢

木香

三錢

肉豆蔻

三箇生

秦艽

洗羌活

生髮

紙燃火燒存性

破故紙

炒各三錢

右細末煉蜜丸彈子大每服一丸煎棗湯空心嚼下

參芪散

出直指方

治勞瘵嗽喘咯血耳焦潮熱盜汗

柴胡

當歸

明阿膠

炒酥

黃芪

蜜炒

白茯苓

川芎

半夏

製

貝母

去心

枳殼

製

北桔梗

秦艽

洗

甘草

焙各五錢

人參

北五味子

羌活

防風

杏仁

浸水

去皮

款冬花

桑白皮

炒各三錢五分

生鼈甲

去裙米醋炙

紫苑

茸

右藥末每服二錢五分薑棗煎食後少頃服

沉香鼈甲散

治勞瘵身痛

方見虛勞門虛勞類

凝神飲子

出仁存方

治勞瘵憎寒發熱口乾咽燥自汗咳嗽

唾血瘦劇倦乏

人參

去蘆

當歸

去尾

白芍藥

白茯苓

去木

黃芪

去蘆

白朮

半夏麴

五味子

熟地黄

甘草

川芎

蓮肉

大麥門冬

去心

桔梗

以上各等分

右為麴末每服四錢用水一盞半烏梅棗子各一箇

煎至七分去滓服如嗽加阿膠虛極胸滿者加水香

濕紙煨沉香亦得不思食加扁豆一方無川芎

桃仁煎

出直指方

治勞瘵傳尸骨蒸倦弱

大川椒

出汗

生犀角

當歸

續斷

各一兩

桃仁

去皮炒

鼈甲

醋炙黃各一兩五錢

白礬

煨猪牙皂角

蛤蚧

一雙去頭足洗

酥炙

安息香

蘇合香

雄黃

各一分

麝

一錢

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九米飲下

或用真川椒泡湯下

虎牙丸

出直指方

治勞瘵瘦悴咳嗽聲啞骨痿殺下瘵蟲

紫河車

一具即男子胎衣水洗淨酒醋再折洗用童便並好酒煮爛

麝

五鹿茸分

七錢五分 **黃狗頭** 取肉四兩童便並酒煮爛 **大紅川椒** 去合口并子以黃捍

紙托之就放於熱爐內頻撥去 **生鼈甲** 一枚去裙油頓地上蓋一宿一兩五錢 醋浸一宿

又醋一盞仰盛 **桃仁** 水浸去皮 **秦艽** **木香** **明阿膠**

慢火炙令醋盡 **雄黃** **安息香** **生髮** 紙燃火燒存性 **虎**

五錢 **頭關骨** 酒浸二宿炙焦一兩五錢

右為細末以紫河車狗肉杵粘為丸桐子大每服七

十粒月首五更空心米湯下午時又服如無胎衣以

雄猪肚代用修事同

治勞疾

出百一  
選方

虎糞內骨

一錢人骨為最獸骨次之殺虎大腸用  
著亦可用青蛇腦小豆許或菜豆許同

酥塗炙色轉為度無  
蛇腦只酥炙亦得

天靈蓋

三錢酥炙  
黃為末

鼈甲

者極大  
酥

炙黃為末一  
兩九肋者妙

青蒿

取稍三四寸  
細判六兩

安息香

五錢  
桃仁一分

去尖研為末  
絹篩過

麝香

一錢  
別研

檳榔

一箇別  
研細末

豉

三百粒

葱白

十二

一根  
打破

童子小便

半升

東引桃柳李桑枝

各七莖麤如  
筋頭大各七

寸細  
剉

楓葉

二十一片如無  
亦得初不曾用

右先將青蒿桃柳李桑枝楓葉豉以官升量水三升

煎至半升許去滓入安息香天靈蓋虎糞內骨鱉甲  
桃仁與童子小便同煎取汁去滓有四五合將檳榔  
麝香同研均調作一服早晨溫服以被蓋覆出汗恐  
汗內有細蟲以帛子拭之即焚此帛相次須瀉必有  
蟲下如未死以大火焚之並棄長流水內所用藥切  
不得令病人知日後亦然十來日後氣體復元再進  
一服依前焚棄至無蟲止此藥如病者未極可以取  
安已極俟其垂死則令下次已傳染者服之先病者



# 不可救後來斷不傳染

袁州寄居五節郎李應本相州法司嘗以吏役事韓似夫樞密兵火後忽於宜春見之云從岳侯軍得官今闕居於此從客問其家事潸然淚下曰應先有兒女三人長子因買空宅無人所居之室忽覺心動背寒遂感勞疾垂殆傳於其次室女長子既死女病尋極繼又傳於第三子證候一同應大恐即禱於城隍每月設麪飯以齋雲水異遇異人且許謝錢三千萬數日因往市中開元寺前有一人衣羽士服自稱貧道踵足而呼曰團鍊聞宅上苦傳尸勞貧道有一藥方奉傳同入寺中問其姓名不答曰投云云應即假筆書之道人言欲過湖南應留之飯云已喫飯了欲贈之錢云有盤纏臨行又言此藥以天靈蓋虎糞內骨為主切須子細尋覓青蛇腦如無亦可服藥前一日須盛享城隍求為陰助應曰既求於神何必用藥道

人曰不然即揖別西去應以事頗異敬如其言治藥  
既成設五神位各具飲饌十品如待賓客以享城隍  
又別列酒食以攜陰兵仍於其家設使者一位於病  
榻之前服藥食頃臟腑大下得蟲七枚色如紅蠟肉  
而腹白長約一寸濶七八分前銳後方腹下近前有  
口身之四週有足若魚骨細如針尖而曲已死試取  
火焚之以鉄火筋剗刺不能入病頃減後又服一劑  
得小蟲四枚自此遂安今已十年肌體悅澤不復有  
疾道人後竟不來此方傳之  
樞密之孫韶州使君希道

蠟杏湯

出醫學切問

治遠年日近勞疾

柴胡 桔梗 甘草 各一錢 老鼠刺根 黃芩 茴

香

炒 驚栗殼

去蒂穰蜜炙

胡椒

各二錢

烏梅

黃蠟

杏

仁 欵冬花 各一錢

右以新瓦瓶盛水三四碗安藥在內密封慢火煨熟  
睡至四更煖服一盞喫盡用好酒三四碗再煨滓再  
服亦如前婦人加當歸男子加人參吐血加阿膠北  
五味子

再生丹 治一切勞證黃瘦虛損諸藥不能治者此藥  
大效

沉香

八錢五分

木香

五錢

檳榔

五錢

大茴香

一兩

小茴香

一兩

鹽炒木通 穿山甲一兩 全蝎一兩 通草一兩 燈草五錢

頭紅花二錢五分

右為細末甘草膏子為丸如梧桐子大每服三四十

丸酒鹽湯空心服乾物壓之

雄麝丸

出直指方

治勞瘵殺瘵蟲下惡物

雄黃 雌黃 青黛乾 代赭石

煨醋

硃砂

研細各二錢五

分 大蝦蟆一箇酒炙黃 安息香 阿魏酒浸研用 男子

天靈蓋酥炙黃 麝五錢 川巴豆肉肥者十粒

畧去油

右為細末軟粳飯頭揉和杵丸如桐子大每二十粒

桃仁十四箇去皮研煎湯月初五更空心下

治瘦

出本草

用牛肝醋煮食之

又方

出本草

治遠年日近勞疾

取雄貓兒腦髓眼睛生用熱酒浸服其勞蟲便從鼻  
出一方黑貓生取肝曬乾為末月首五更空心酒調  
服或酒浸服能殺療蟲

治男子婦人骨蒸勞瘵憎寒發熱

出經方  
良方

青蒿

春夏用葉秋冬用子不用葉用根不用子用莖四者相似而反以為痼疾必用童子小便

浸過或有功無毒止一握

大鼈甲

醋炙去醋

白朮

煨

地骨皮

白茯苓

苓 桑白皮

粉草

炙

揀參

瓜蒌實

北柴胡

去蘆

右為末每服三錢水一盞薑三片煎服

清骨散

出經驗良方

治男子婦人五心煩熱欲成勞瘵

北柴胡

七錢五分

赤茯苓

用一兩

人參

防風

去蘆

熟地黃

秦艽

各一兩

生地黃

用一兩

胡黃連

五錢

薄荷葉

七錢五分

右咬咀每服四錢水一盞煎七分溫服患骨熱者先服荊蓬煎丸一服使臟腑微利然後服此

蠟煎散

出醫學切問

治一切勞疾

白鷄冠花子

木香

各一錢

人參

去鹽炒

馬尾勃

青

蒿子

一勾童子小便浸三宿

鼈甲

炙醋

款冬花

各五錢

糯米

一甘

草

二錢

右為末每服三錢水一盞烏梅黃蠟煎無時服

十全大補湯

一名金飲子出百一選方

治發寒熱漸成勞瘵加黃連

煎服更加青蒿鼈甲煎亦治骨蒸發熱飲食自若者方見

諸虛門補益諸疾類

燒髮方

出直指方

治勞瘵

用生髮燒存性為末以水調之空心服此亦用枕骨之意蘇合香丸皆要藥也

治勞瘵病症已見而未成者

出百一選方

取稻草根細切濃煎不以時候熟水飲之

芎歸血餘散

出直指方

治勞瘵



室女頂門生髮

一小團井水洗去油膩法醋浸一宿日中酒乾紙裹火燒灰存性

當歸

三錢

真川芎

五錢

木香

桃仁

水浸去皮焙各二錢

安息香

雄黃

各一錢

全蝎

二枚

江上大鯉魚頭

生截斷一枚醋炙酥

右為末分作四服每服井水一大碗淨室中煎七分入紅硬真降香末五分服此藥燒北斗符入藥月初五更空心向北目天呪月療神害我生人吾奉帝勅服藥保身急急如律令念呪五遍北面服畢面南吸生氣入口腹中燒真降香置床下午時又如前服

藥後以鼈甲生犀散取蟲

北斗符勅

咒

念北斗呪

硃砂書符

鼈甲生犀散

指出直指方

治療疾殺瘵蟲取出惡物

天靈蓋

一具男者色不赤可用女者色赤勿用以檀香煎湯候冷洗呪曰雷公靈雷公聖逢

傳尸即須應急急如律令呪七遍次用酥炙令黃

生鼈甲

一枚去裙醋炙黃

鷄心

檳榔

五錢

安息香

五錢

虎長牙

二箇醋炙酥如無桃仁則用牙關骨五錢

水浸去皮焙乾五錢

生犀角

木香

甘遂

真降香

乾

漆

杵碎炒烟出畧盡存性

阿魏

酒浸研各三錢

穿山甲

取四趾醋炙焦

雷丸

二錢 蚯蚓

十條生和藥

全蝎

三箇

右為末每服五錢先用豉心四十九粒東向桃李桑梅小稍各二莖長七寸生藍青七葉青蒿一小握葱白連根洗五片石臼內同杵用井水一碗半煎取一盞入童便一盞并藥煎取七分入麝一字月初旬五更空心溫服即以被覆汗恐汗中有細蟲軟帛拭之即焚其帛少時必瀉蟲以淨桶盛急鉗取蟲付烈火

焚之并收入磁器中瓦片傳雄黃蓋之泥和灰扎埋  
深山絕人行處

五枝散

指出直方取下傳尸勞蟲

桃枝 李枝 梅枝 桑枝 石榴枝

并東向小枝各七莖

長三寸

青蒿

一小握

苦楝根

白皮七寸

葱白

連根洗七片各寸截

生藍

青

七葉

右以童便一升半煎收其半去滓入安息香蘇合香  
阿魏各一錢煎至一盞濾清調朱砂雄黃雷丸枯白

礬硫黃末各五分鷄心櫛櫛末一錢五分麝一字分  
作二服月初五更空心進一服五更五點又進一服  
約午前下瘵蟲淨桶盛急鉗收入油銚內煮仍傾油  
蟲入磁器灰扎埋山僻處

地骨皮散 治男子婦人童男室女骨蒸壯熱肌肉減  
瘦面痿黃小便赤色惡心潮熱夜多盜汗嗜卧少力  
口苦乾肢節煩疼漸成勞瘵

當歸

兩四

黃芪

兩半

秦朮

兩六

知母

兩二

枳殼

兩一

地骨皮

兩一

甘草

一觔

右咬咀每服五錢水二盞生薑三片烏梅棗子各一箇煎至八分去滓溫服不拘時候

小靈寶丹

一名辟邪丹  
出海上名方

斷傳染疾去邪夢恍惚安精神

天靈蓋

一枚得蔡州者  
良塗酥炙令黃

虎頭骨

一兩塗酥  
炙令黃

鬼箭

一兩

白朮

一兩對酥  
炙令黃赤

朱砂

一兩上品  
者別研

雄黃

一兩上品  
者別研

麝

香

一兩真  
者別研

右擇子寅辰午申戌日午時前修合靜室中勿語依

法杵羅前四味末同後三味末合勻研細煉蜜為丸  
如梧桐子大每服七丸漸加至十九丸煎安息香湯下  
食後日二服七日中當有靈異或有影響或若夢有  
人辭去病當安

代勞鬼哭飲子

柴胡五錢秦艽五錢阿魏五錢東引桃枝一握青蒿一握甘草

炙半分檳榔生研末分作三服用

右各細剉以童子小便二升浸一宿至明早煎至一

升去滓分作三服每服如前檳榔末和勻空心溫服  
如人行數十里又進一服男病女煎女病男煎喫一  
二服或吐或泄即不用服第三服若未吐則再進第  
三服病在上則吐在下則泄出惡物或異色蟲或如  
亂絲髮一月內忌麪食肥脂葱菜等物合及煎時不  
得孝子姪婦鷄犬見藥滓長流水中棄之

全蠶丸

出直指方

治勞瘵虛熱嗽喘

知母

貝母

去心各三兩

明阿膠

炒酥各五錢

柴胡

二兩

芎



一當歸五錢杏仁浸去皮  
兩三兩

右麤切入厚磁器中用中等鼈一箇活宰於頭上去  
鼈病以鼈肉并血并藥用醇酒五升同浸一宿密紙  
封次早慢火同煮候香熟取鼈令病者隨意食之只  
留鼈甲并骨并藥焙乾為末以浸藥酒汁調米粉糊  
為丸如梧子大每七十丸不時米飲下

萬全飲一名青蒿飲治一切勞疾傳尸勞瘵不問遠年  
出聖惠方

近日皆治之此藥妙不可言

阿魏

一分童子小便磨化

甘草

大者三寸

東引桃枝

小者一握

青蒿

握用子

檳榔

一兩末

葱白

三寸并根

右用童子小便二升浸桃枝蒿草葱白四味一宿來日五更初煎取六合去滓入阿魏更煎兩沸分為二服每服臨喫時入檳榔末五錢同服入覺惡心必吐吐後更進第二服服時並不得人知不得患人與及不可與患人對面恐惡蟲飛入人口鼻內此藥如女人患男子面北與煎服男子患女子面南煎忌猫犬

見春二服秋三服一年五服勞蟲并盡病若在上先吐若在下先利皆出黑蟲如髮及似馬尾一方有東

向柳枝無蔥白

五枝散

一名青桑枝飲  
出醫方集成

取勞蟲方

青桑枝

柳枝

石榴枝

桃枝

梅枝

各七莖  
每長四

寸青蒿一小握

右用童子小便一升蔥白七莖去頭葉煎及一半去滓別入安息香阿魏各一分再煎至一盞濾去滓調

辰沙末五分檳榔末一分麝香一字分作二服調下  
五更初一服五更三點時一服至巳時必取下蟲色  
紅白者可救青黑者已傳入臟不治見有所下即進  
軟粥飯溫煖將息不可用性及食生冷毒物合時須  
擇良日不得令猫犬孝服穢惡婦人見之危氏方名  
青桑枝飲有鬼白赤箭各五錢凡傳屍者必須先服  
此藥取下蟲然後隨證調治亦不可一槩用如初取  
下蟲色已黑縱服妙藥亦無補也然猶不使傳他人

一方無石榴皮

藍汁方

出直指方

殺瘵蟲惡蟲皆化為水

生藍青葉

研取自然汁一大盞

雄黃

枯白礬

安息香

紅硬降真香末

各五分許

右以雄黃等同研入藍青汁內月初五更空心服此方通治蟲毒解諸毒

潤神散

出三因方

治勞瘵憎寒發熱口乾咽燥自汗皮劇煩

躁

人參 黃芪 淡竹葉 甘草 炙桔梗 麥門冬

各等分

右為末每服二錢水一盞煎七分不以時自汗大小

麥同煎溫服

治勞疾

木香

二兩

麻黃

二兩

陳皮

杏仁

艾

各四兩

右用好酒一瓶入藥瓶中浸一箇月日進二盞空心

服

薤白散 治久患咳嗽肺虛成勞瘵及吐血咯血等患

驚甲

灸二兩

鹿角膠

分三

甘草

一兩

阿膠

炒一兩

右為散每服三錢用水一盞入薤白一莖長二寸同煎至六分食後臨卧先嚼薤次服藥一日三服

專治勞瘵

杏仁

一升去皮尖小童小便冬浸五日夏浸三日取出新水淘淨後用

胡桃仁

十四

九箇湯浸去皮蜜養

人參

一兩

白礬

五錢

右熬成膏丸如彈子大每服一丸噉化食後服

猪肚丸

出御藥方

治男子肌瘦氣弱咳嗽漸成勞瘵

白朮

牡蠣

燒各四兩

苦參

三兩

右為細末以猪肚一箇煮熟研成膏和丸如梧子大每服三四十九米飲下日三四服神效瘦者服即肥莫測其理潁昌李薦方叔其子得效施人亦屢應

明目丹

出百一選方

治勞瘵

硃砂

硃砂

雄兔糞

三味各等分

右為末用生蜜為丸如梧子大每服七丸甘草一分



搥破新水半盞揉甘草濃汁吞下每服日須初一以後十五以前五更時令病人坐起須預戒令不得作聲息氣服之作聲即不效或怕水冷微溫不妨每合藥時必於八月十五日三更前合如急要服則就每月十五日以前月明依合勿令婦人雜人鷄犬貓畜見合時與服時倘過人不得作聲切切記

治蟲解勞悅澤肌膚去勞熱

檳榔

一兩

五錢 龍膽

一兩

乾漆

五錢

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九至十五丸熟水吞下

治患勞人燒香法

出本草

玄參

一觔

甘松

六兩

右為末蜜一觔和入瓶內封閉埋窖十日却取出用炭六兩燒又用蜜六兩再入瓶內埋五日取出燒常令病人聞香氣其病自愈

治勞病

錦文大黃

半觔

血竭

五錢五分

右用酸醋五升用砂鍋內煮令醋乾同血竭為末煉

蜜為丸彈子大空心服男子青木香湯下婦人當歸

紅花酒送下

柴胡散

出經驗良方

治邪入經絡體疲肌熱兼治伏暑

柴胡

四錢

甘草

右為細末每服二錢水一盞煎至八分食後熱服冬

潤肺春夏解勞傷老幼者可服

治勞氣

用小芥子三升搗末絹袋盛酒三浸之蜜七日去滓  
溫服半升漸至一升半得方便合忌如法藥

神傳膏

出本  
事方

治勞瘵吐血妄行

用剪草一觔婺州皆有惟婺州者可用狀如茜草  
又如細辛淨洗為末入生蜜一觔和為膏以銀石器  
盛之不得犯鐵器九蒸九曝一日一蒸曝病人五更  
起向東坐不得語用匙挑藥如粥服之每服四匙良

久用稀粟米飲壓之藥冷服粥亦不可大熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常咳嗽血妄行每一服時神效○有一貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方示之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿令服藥次日將服之為屋主墜器中不可服再合既成又將服為猫覆器又不可食又再作未就而是人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一啜而愈或云是陸農師夫人鄉人艾子先嘗親說此事

渠後作大觀本草亦取入集中但人未識不苦信爾

太上延年方勝追魂散

出華陀中藏經方

治勞瘦垂死方

人參

杏仁

去皮尖

天靈蓋

一兩炙

椒

一分去目微炒出汗

柳桃

心

一小握

柴胡

一兩

右用童子小便一升末一兩煎令熟空心日午各服

五日效

神僊奪命丹

出楊氏家藏方

釣傳尸勞蟲

石燕子

一枚火燒令紅醋淬候冷

母丁香

一錢五分

水磨雄黃

二錢酒

蠟五錢 蟹血一蛤

蚶殼

右件為細末將酒蠟蟹血同化開為膏子次入餘藥  
和成劑丸如菉豆大每用一九裝在鈎子繫上鈎緋  
線一丈二尺再用絲線少許裹纏藥丸令患人先喫  
糕兩口後用一服此藥吞下良久線動用力拽出急  
以鐵鉗投熱油內急煎五月五日未出時合藥不  
得人見

治一切男子勞蒸傳尸流連鬼注夜夢不祥精原流出

氣虧損小便頻數忽黃忽赤喫食減少心躁不安身  
上肉忽覺枯瘦面色乍青乍黑乍赤乍白變異不定  
精神不足多困劣大腑傷熱一切勞候百般病證并  
治之脉氣洪大亦可喫

出楊子建萬  
全獲命方

黃連

肉豆蔻

當歸

各四  
銖

麻黃

去  
根

天靈蓋

酥炙  
焦色

鼈甲

醋炙各  
五錢

杏仁

虎骨

酥炙

茯苓

去  
毛

貝母

去  
心

沉香

木香 羌活

牡丹皮

去  
心

桔梗

前胡

去  
毛

荊芥

穗

各一  
分

細辛

三  
銖



右杵骨藥三件為末所餘藥為散每服一兩以童子  
小便一碗半於新瓷瓶內煉之四面以糠火燒煉取  
一盞半至鷄鳴時空心去滓熱喫臨藥熟時更入葱  
頭五枝同煉內有天靈蓋虎骨鼈甲等依法修製杵  
羅如飛塵所餘衆藥等只麤羅為主散却盡底相滾  
令勻然後煎煉服餌留滓焙乾為末炒熟麪相滾滴  
水丸如梧桐子大食後熟湯下三十丸

神授散

出危氏世  
醫得效方

治諸傳尸勞氣殺蟲

右用川椒二觔擇去子并合口者炒出汗為末每服  
二錢空心米湯調下須痺暈悶少頃如不能禁即以  
酒糊丸如梧桐子大空心服三五十丸昔人嘗與病  
勞婦人交婦人死遂得疾遇一異人云勞氣已入臟  
遂令急服二觔其病當去如其言服之幾盡大便出  
一蟲狀如蛇遂安續有人服之獲安濟者多矣

治膏肓勞嗽喘滿成瘵

出永類  
鈴方

真蘇合香丸

四兩

通明雄黃

二兩

黑錫

炒灰  
五錢

右辰日取東引桃枝二尺四寸柳枝一尺二寸東引  
石榴根六寸槌碎水熬二盞至一盞復熬至半盞瓦  
器中煎之乳鉢中將前三藥旋入藥汁中搗千餘杵  
分作三十九丸朱砂末二錢麝香少許為衣曝乾薑湯  
嚼下乾嚼亦可却服助藥噉甚者合香只二兩次以  
黑錫作細末每服五錢五更初炙猪肉焦喫助之又  
補以青蒿蟹生嘉禾散等分烏梅薑棗煎服一月愈

夏貴公熏勞法

出永類  
鈴方

好雄黃

三錢

茜草

二錢

款冬花

二錢

玄參

三錢

百部

三錢

艾葉

一信石

五錢

雌黃

五錢

雷丸

厚朴

末作

以香爐有蓋者封止留一小孔出烟患人以紙塞鼻以口吸其烟久則飲少許清米飲日三次蟲死嗽愈加百部無夷仁蘇木熔蠟和攤紙上貴公在蜀作宣撫甚秘寶之以膏肓之疾藥不能及熏之有效

治勞瘵

出永類  
鈴方

聖濟總錄三月四日取桃葉五升熟搗脫衣避風密

室中坐其上從旦至暮尸蟲悉出

又方

出永類  
鈴方

空心食榧子百箇諸蟲悉化為水

又方

出永類  
鈴方

桃仁去皮研膏煮汁如米作稀粥空心日二服

又方

出永類  
鈴方

又用桃葉搥汁服

又方

出永類  
鈴方

酸石榴皮東引無根水濃煎初更服天明蟲下稀粥補之

治傳尸勞疾羸瘦者

右以鱉甲一箇燒令黃色篩末酒服方寸七日二

治瘦瘁咳嗽骨蒸勞瘵止渴去熱風

出本草方見虛勞門虛勞渴類

主勞嗽骨蒸久積羸弱成瘵者

出本草

以溫州白乾薑一物漿水煮令透心潤溫濕取出焙

乾搗篩陳廩米煮飯飲丸如桐子大一服三五十丸

湯酒任用其效如神

治瘦病骨蒸羸瘦虛弱四肢少力

方見食治門食治五勞七傷類

治瘦病咳嗽骨蒸羸弱助血

方見虛勞門虛勞咳嗽類

崔氏灸穴

崔氏丞相灸勞治外臺秘要崔家傳方

及王寶臣經驗方悉編載然皆差設毗陵郡有石刻最詳予取諸本叅校成此一書比石刻方極為委曲依此治人未嘗不驗往往一灸而愈予在宜成久病虛弱亦用此而愈

唐中書侍郎崔知悌序

夫含靈受氣稟之於五行攝生垂理降之以六疾居  
岐黃廣記蔚有舊經攻灸兼行顯着斯疾骨蒸者亦  
名傳屍生謂殮殍亦稱復連亦曰無辜丈夫以癖氣  
為根婦人以血氣為本無問少長多染此病嬰孺之  
流傳注根若其為狀也髮乾而聳或聚或分或腹中  
有塊或腦後兩邊有小結多者乃至五六或卧出盜  
汗夢與鬼交雖目視分明而四肢無力上氣食少漸



就沉羸縱延時日終於殭盡予者忝洛州司馬嘗三十日灸活一十三人前後瘡者數踰二百至於狸骨獺肝徒聞曩說金牙銅鼻罕見其能未若此方扶危濟急非止單攻骨蒸又別療氣療風或瘡或勞或邪或癖或患其狀甚廣灸活者不可具錄略陳梗概又恐傳受訛謬以誤將來今故具圖形狀庶令覽者易悉使所在流布頗用家藏未假外請名醫旁求上藥還魂返魄何難之有遇斯疾者可不務乎

取穴法

先兩穴令患人平身正立取一細繩蠟之勿令展縮  
順脚底貼肉堅踏之男左女右其繩前頭與大拇指  
端齊後令當脚跟中心向後引繩循脚肚貼肉直上  
至曲脊中折橫絞截斷又令患人解髮分兩邊令見  
頭縫自顙門平分至腦後乃平身正坐取向所截一  
頭令與鼻端齊引繩向上至循頭縫至腦後貼肉垂  
下循脊骨引繩向下至繩盡處當脊骨以黑點記之

黑點不  
是灸處

又取一繩子令患人合口將繩子按於口上

兩頭至吻却鉤起繩子中心至鼻柱根下如此便齊

兩吻截斷將此繩展令直於前來脊骨上墨點橫量

取平勿令高下

繩子先中摺當中以墨記之却展開繩子橫量以繩子上點墨正壓脊骨

上墨點為正兩頭取平令無高下

於繩子兩頭以白圈記

白圈是灸穴

以上是第一次點二穴

次二穴令其人平身正坐稍縮臂膊取一繩繞項向

前雙垂與鳩尾齊

鳩尾是必岐骨人有無心岐骨者至雙胸前兩岐骨下量取一寸即

是鳩尾也即雙截斷却背翻繩頭向項後以繩子中停取

心正令當喉嚨結骨上其繩兩頭夾項雙垂循脊骨

以墨點之墨點不是灸處又取一繩子令其人合口橫量齊

兩吻截斷還於脊骨上以墨點橫量如法繩子兩頭

以白圈記之白圈處是灸穴

以上是第二次點穴過前共四穴同時灸日則各七壯至二十七壯累灸至一百壯或一百

五十壯為妙候瘡欲瘥又依後法再灸二穴

又次二穴以二次量口吻繩子於第二次雙繩頭盡

處墨點上當脊骨直上不堅點令繩中停中心在墨

點上下繩盡頭以白圈兩穴

白圈是灸處

以上是第三次

點兩穴調之四花穴灸兩穴各百壯  
三次共六穴各取離日各取離日量

度訖即下火唯須三月三日艾最佳疾瘥百日內慎  
飲食房室安心靜處將息各一月後覺不瘥復初穴

上再灸

圖形於後

闕



欽定四庫全書



博濟方  
卷二百三十五

五十一

--	--	--	--	--	--	--	--



凡骨蒸之後所起辨驗有二十二種並依上項灸之

濟出

生方

一胞蒸小便赤黃

二玉房蒸

男遺尿失精  
女月漏不調

三腦蒸頭眩悶熱

四髓蒸覺髓沸熱

五骨蒸齒黑

六筋蒸甲焦

七血蒸髮焦

八脉蒸急緩不調

九肝蒸

或時眼  
前昏眩

十心蒸舌焦

或瘡或時  
胸滿悶

十一脾蒸

唇焦折  
或口瘡

十二肺蒸

口乾  
生瘡

十三腎蒸

耳乾焦

十四膀胱蒸

右耳焦

十五膽蒸

眼目失光

十六胃蒸

舌下痛

十七小腸蒸

下泄不禁

十八大腸蒸

右鼻孔疼痛

十九三焦蒸

乍寒乍熱

二十肉蒸

別人覺熱自覺冷

二十一皮蒸

皮肉蒸起雞皮起

二十二氣蒸

變身壯熱不自安息

用尺寸取穴法

出濟生方

凡孔穴尺寸皆隨人身形大小須男左女右量手指中心一節兩橫紋中心為一寸

艾炷大小法

出濟生方

凡艾炷須令脚根足三分恐覆孔穴不備穴中經脉火氣不行即不能抽邪氣引正雖小兒必以中指取穴為準

取艾法

出濟生方

端五日日未出於艾中以意求其似人者輒採之以灸殊有効幼一時見一書中云爾忘其何書也艾未有真似人者於明暗間苟以意命之萬法皆妄無一

金匱要略卷之二十一  
真者此何疑耶

用火法

出濟生方

黃帝曰松柏柿桑棗榆柳竹等木火用灸必害肌血  
慎不可用凡取火者宜敲石取火或水晶鏡子於日  
得者太陽火為妙天陰則以槐木取火亦良

治勞瘵

膏肓肺腧穴每穴各灸九壯仍依蟲醉日各穴腧穴  
多多為妙灸後百日忌煎煑生冷熱物毒食仍戒房

事避風寒減喜怒安心靜處將息若一月猶覺未瘥  
於初穴上再灸

灸勞病方

出瑞竹  
堂方

從下數至第三根短筋稍尖上灸二寸炷男左女右  
又於項後數下至第三脊溝點穴灸隨病人年紀幾  
十歲即灸幾十炷

灸勞瘵方

膏肓二穴可以回生或肚臍相對取背脊骨正對灸

有驗艾炷亦不可多

骨蒸傳屍之病乍寒乍熱有時脣赤或頰赤并痢血多  
唾欲得食或不欲食兩脊脉常急患人多效盜汗以指  
按捻脊脊四邊肉有時心胸脹滿氣急黃瘦脊中肉盡  
遂即着床胸前自動脊脊兩邊肉盡灸療即難如灸候  
胸前肉動非是灸法如看病人是病更不須選離日即  
將病人於五道頭日午時灸灸七壯若先知其病又緩  
即取離日午時大吉欲灸覆病人面向下着地取掇肋

頭以病人大拇指自捻着展中指直向脊骨指頭脊脊  
中肉小筋上點記從點記處向上至耳下尖頭即中尖  
屈繩從初點處向上還當脊脊點繩所到記之更又在  
屈繩從元點記處向上還準前點記一邊點四處兩邊  
俱點總八處各須去脊骨遠近一種并須上下相當下  
從攢筋上至耳根取直其八處一時下火艾炷如棗核  
大堅實作灸了即以灰三匝圍坐處便歸家不須回顧  
禁麪生冷肉時忌色及雜食平復後任依常未平復有

若犯重發即不可復療

神素師灸骨蒸效法

當頭耳孔橫量相離三寸許相當灸有穴日灸三壯  
至第八日灸二七了第三椎上第二椎下男取左手  
女取右手頭指依兩指頭東西灸日一七壯至第八  
日各灸五十壯復五日各灸十五壯脛取繫鞋橫  
大文量至膝可口亞骨切下中分當脛骨外日灸一七壯  
滿第八日日灸滿三十五日了當背上皆男左女右



取頭指取腕文當指當頭灸日七壯至第八日滿百壯婦人肚脹月節不通取左手頭指當臍量至下腹當指頭灸日七滿三百壯膈上午後灸膈下午前灸又灸法

立脚於繫鞋處橫文以手四指於文上量脛骨外逼脛當四指中節按之有小穴取一縷麻刮令薄以此麻緩繫上灸令麻縷斷男左女右患多愈

指掌穴

出經驗濟世方

治勞疾用紙條比病人手自中指末盡

手掌第一橫文又益之以半是為一掌半將此一掌半  
紙條斷而為二去一半不用以此紙條自病人項後第  
一槌骨當中比向下至紙條盡處以墨記之此是高下  
也

臍心穴

出經効  
濟世方

治冷病人跣足於平地上正立用木杖

子自地比至臍心截斷竹杖用此杖却自後比至杖盡  
處以墨記之此亦是定高下也

取寸法

出經効  
濟世方

治取病人中指中節外紋為一寸切不

可用內紋也指掌穴用一寸點兩穴臍心穴用一寸二分點兩穴皆於元墨記處相去一寸及一寸二分非謂兩旁各一寸及一寸二分也凡此指掌并取寸皆男左女右比之每穴灸七十壯至百壯後凡百忌慎百許日第一推又非大推大推再第一推上陷中也如無醫者此方立効凡風寒之氣客於中滯而不能發故瘠不能言及喉痺失聲皆風邪所為也入臟皆殺人凡尸厥而死脉動如故此陽脉下墜陰脉上爭氣閉故也針百入三分補之

以龜突墨彈丸將水和服又針足中指頭去甲如韭葉  
又針足大指甲下內側去甲三分

一法以癸亥夜二更六神皆聚之時解去下體衣服於  
腰下兩旁微陷處鍼灸家謂之腰眼直身半立用筆點  
定然後上床合面而卧每灼小艾炷七壯勞蟲或吐出  
或瀉出即時平安斷根不發更不傳染令病人偃卧用  
皮紙條浸濕自項高骨直貼至尾脊骨看何處一點先  
乾乃穴也以筆點記灸二十一壯此腰眼穴俗言不可

灸為明堂經不載是不然蓋所謂即臚也

出永類  
鈴方

### 呪法斷伏連解法

右先覓一不開口葫蘆埋入地取上離日開之煮取三匙脂粥內其中又剪紙錢財將向新塚上使病兒面向還道背塚坐以紙錢及新綜圍塚及病人使匝別將少許紙錢圍外與五道將軍使人一手捉葫蘆一手於坐旁以一刀穿地即以葫蘆一手於穿地及坐葫蘆上使一不病人捉兩箇鑠拍病人背呪曰伏連

伏連解伏連伏連不解刀鑱解又呪曰生人特地上  
死鬼特地下生人死鬼即各異路呪訖令不病人即  
擲兩鑱於病人後必取二鑱相背不背更取擲取相  
背止乃還勿反顧又取離日令病人騎城外車輒面  
向城門以水三升灰三重圍病人又作七箇不翻餅  
於五道將軍呪曰天門開地戶閉生人死鬼各異路  
今五離之日放捨即歸呪訖乃還莫回頭此法大良  
按摩法療骨蒸方


右患癰瘰

上於却切  
下於攝切

等病必瘦脊骨自出以壯丈夫

屈手頭指及中指夾患人脊骨從大椎向下盡骨極  
指復向上來去十二三迴然以中指於兩畔處極彈  
之若是此病應彈處起作多頭可三十餘頭即以墨  
點上記之取三指大青竹筒長寸半一頭留節無節  
頭削令薄似劍煮此筒子數沸及熱出筒籠墨處按  
之良久以刀彈破所角處又煮筒子重角之當出黃  
白赤水次有濃出亦有蟲出者數數如此角之令惡

物出盡乃即除當目明身輕也



普濟方卷二百三十五